

# 桃園縣 100 年度縣立各級學校護理人員暨營養師試務聯合甄選【護理人員】試題

注意事項：1. 本試卷共 100 題、計 5 頁，請仔細檢查並注意題號、頁數，確認後開始作答。  
2. 一律於答案卡上作答，如未依規定塗寫不予計分。  
3. 配分方式：每題 1 分，答錯不倒扣，共 100 分。

1. 台灣地區國小學童最嚴重的體格缺點為何？  
(A)近視 (B)肥胖 (C)齲齒 (D)寄生蟲
  2. 學校護士針對學校環境所作的評估，下列何項是合乎學校衛生標準？  
(A)每 45 名男生有 1 個小便器 (B)飲水機餘氯大於 4.0 mg/dl (C)學生桌面的平均照度值應大於 700 米燭光 (D)椅子的椅面高度為學生身高的 2/7
  3. 有關學校衛生護理工作中，下列何者屬於第一段第二級預防工作？ (A)指導體適能訓練 (B)衛生小天使訓練 (C)牙齒塗氟計畫 (D)設計無障礙空間之環境
  4. 在處理可燃性廢棄物時，最安全最衛生的方法為下列何者？(A)衛生掩埋法(B)焚化法(C)堆肥法(D)氣化法
  5. 王同學於進食營養午餐後，於凌晨 1-2 點時，發生腹痛、帶血水樣便等症狀，則其最可能是下列何種細菌性中毒？ (A)腸炎弧菌 (B)葡萄球菌 (C)肉毒桿菌 (D)沙門氏桿菌
  6. 下列關於腸病毒的敘述何者正確？ (A)感染過腸病毒之手足口症的患者，以後不會再得到相同病症 (B)目前沒有任何一種腸病毒可以有疫苗以茲預防 (C)一般而言，感染者之傳染力在發病前一週是最高的 (D)腸病毒是一群病毒的總稱，目前共約有 60 多種病毒
  7. 我國主管學校衛生事務之最高行政單位是？  
(A)防疫處 (B)疾管局 (C)體育司 (D)保健處
  8. 社區護理人員為維護弱勢群體的健康權益，協助其爭取應有的服務與補助，並在適當時機傳達此群體需求，以作為研擬健康政策之參考，此時，社區護理人員扮演的角色為何？  
(A)諮商者(B)個案管理者(C)代言者 (D)照護提供者
  9. 尼昆小學發現有學生罹患日本腦炎，校護最晚應於多久時間內，向當地衛生主管機關報告？  
(A)一天內 (B)兩天內 (C)三天內 (D)一週內
  10. 尼昆國中有 300 位老師參加衛生所骨質密度篩檢活動，結果發現有 45 位篩檢出骨密度較低，經醫師診斷後，結果有 38 位確定有骨質疏鬆問題，而其中有 7 位是第一次確診，請問該校骨質疏鬆之盛行率約為何？  
(A)2.3% (B)12.7% (C) 15% (D) 30%
  11. (續 10 題)請問該校骨質疏鬆之發生率約為何？  
(A)2.3% (B)12.7% (C) 15% (D) 30%
  12. 我國「毒品危害防制條例」將物質分為四級，下列敘述何者正確？  
(A)依解毒性、濫用性、危害性進行分級  
(B)海洛因、嗎啡、鴉片乃第一級毒品  
(C)大麻、安非他命乃第三級毒品  
(D)紅中、青發乃第四級毒品
  13. 李老師為小學老師，擔心坐月子後返回學校時，不知如何才能繼續哺餵母乳。校護給予的建議，下列那一項不合適？ (A)在坐月子期間，即建立成功的泌乳 (B)上班時，請家人餵牛奶，下班後再餵母乳 (C)上班時定時將乳汁擠於集奶袋中，置於冰箱中保存 (D)需要家人的支持與鼓勵，並可參加哺乳支持團體
  14. 成立學校「過重學童體重控制班」是屬於健康促進學校範疇中的那一個範疇？  
(A)健康教育與活動 (B)學校的環境支持  
(C)學校的健康服務 (D)學校的衛生政策
  15. 設置無菸校園的示範點，這是屬於 1986 年渥太華健康促進憲章中的那一項行動綱領？  
(A)創造一個支持性的環境 (B)建立一個健康的公共政策 (C)強化社區行動 (D)發展個人技能
  16. 方老師認為家中沒有高血壓的家族史，所以不願參加血壓的篩檢，根據貝克(Becker)之健康信念模式，下列何者正確？  
(A)缺乏對疾病易感性認知，校護應舉例加強之  
(B)缺乏對疾病嚴重性認知，校護應舉例加強之  
(C)缺乏對預防行為的利益認知，校護應加以說明  
(D)行動線索不足，校護應舉例加強之
  17. 某中學女老師們因太忙沒有時間做子宮頸抹片檢查，故吳校護在學校午休時間提供抹片檢查服務，期望此措施可以改變女老師們以下哪一項有關預防子宮頸癌的認知？ (A)嚴重性認知 (B)罹患性認知 (C)利益性認知 (D)障礙性認知
  18. 準備懷孕的張老師，發現德國麻疹抗體呈陽性反應，詢問蔡校護應如何處理，下列回答何者較適合？  
(A)可以準備懷孕 (B)儘速接種疫苗  
(C)德國麻疹並不會影響懷孕 (D)待懷孕後再處理
- 情況：學校護士江護理師，準備對國小四年級學生進行寄生蟲檢查。請回答第 19—20 題
19. 目前台灣地區國民小學檢查學童蟯蟲蟲卵的方式為下列何者？  
(A)由學童的症狀判斷 (B)利用抽血檢查  
(C)請學童帶大便檢體 (D)利用肛門貼紙
20. 檢查結果，發現四年級某班學生有蟯蟲，江護理師需執行下列那些工作？(1)於 24 小時內報告當地衛生機構 (2)對蟲卵檢查陽性學生及其家人給予驅蟲藥治療 (3)加強衛生教育，尤其是飯前洗手 (4)聯絡衛生所，安排預防接種 (5)予以保護隔離，並針對排泄物進行隔離  
(A)(1)(5) (B)(2)(3) (C)(3)(4) (D)(1)(2)(3)(5)

21. 調查校園中缺席率高及常使用健康中心的學生，並請導師及輔導室主動關心學生的學習與生活狀況，是屬於那種自殺防治策略？  
(A)促進壓力調適能力 (B)早期復健  
(C)運用社區資源 (D)早期發現危險個案
22. 徐校護指導國小三年級學生預防近視方法，下列指導內容何者錯誤？  
(1)宜攝取足夠均衡營養如蛋白質、維生素 A 和 B 等  
(2)電視畫面應朝向明亮的窗戶  
(3)看電視的距離應距畫面對角線的 4-5 倍  
(4)看電視時間每 30 分鐘宜休息 10 分鐘 (5)讀書時，光源應來自左後方處 (A)(1)(2)(3)(4)(5) (B)(2)(3)  
(C)(1)(4)(5) (D)(2)(3)(5)
23. 依重高指數評估的準則，若宋倩同學重高指數為 1.02，此學生是屬於何種體位？  
(A)過輕 (B)正常 (C)過重 (D)肥胖
24. 七歲的小昆因為異位性皮膚炎而來到兒科門診，護理人員指導小昆媽媽有關日常照護原則，下列那一項較不適宜？ (A)儘量穿棉質、通風舒適的衣物 (B)以低敏感性的乳液塗抹全身 (C)沐浴時少用肥皂 (D)沐浴時用含殺菌性的洗滌劑，以防續發性感染
25. 有關兒童水痘可傳染期的敘述，下列何者正確？  
(A)出疹前 1-2 天到痘疹結痂後 5-7 天內，均具有傳染力 (B)出疹後 1-2 天到體溫恢復正常前的期間，傳染力最高 (C)出疹前 2-3 週之潛伏期，傳染力最高  
(D)出疹前 1 週、發疹期及痂皮乾燥後 2 週內，均具有傳染力
26. 有關嚴重急性呼吸道症候群 (SARS) 之敘述，下列何者有誤？  
(A)咳嗽是 SARS 病患具傳染性的最好指標  
(B)潛伏期從 2 至 7 天不等  
(C)是由 SARS 病毒所引起  
(D)被列入第一類法定傳染病
- 情況：國二的馬同學幼年時診斷為法洛氏四重畸形 (Tetralogy of Fallot)，在輕度活動時常有呼吸困難、皮膚發紺情形，請回答以下 27-28 題：
27. 校護應教導馬同學避免下列何種情況，以預防心血管合併症的發生？ (1)貧血 (2)感冒 (3)齙齒  
(4)骨質疏鬆 (5)近視  
(A)(1)(2)(3) (B)(1)(2)(4)  
(C)(2)(3)(4) (D)(2)(3)(5)
28. 根據中華民國心臟病兒童基金會的建議，下列哪一項處置不適合？  
(A)可從事教室活動 (B)限於騎自行車運動  
(C)父母應學習心肺復甦術 (D)預防心內膜炎
29. 學校衛生護士的職責，下列何者不正確？  
(A)掌理學校衛生活動中之健康照護 (B)作為學童、學童的家庭及學校工作人員的健康諮詢者 (C)負責傷害學生之護理，必要時並作轉診 (D)作為健康教育者，負責學生健康教育之課程

30. 林校護對於罹患肺結核的家長，最優先的衛生教育是提醒她/他？  
(A)定期胸部 X-ray 檢查 (B)按時服藥  
(C)監測結核菌素試驗 (D)常規性驗痰
31. 校護對國小低年級學童的健康教學，應著重在哪一項？  
(A)健康知識的了解 (B)健康態度的培養  
(C)健康習慣的養成 (D)保健資源的利用
32. 進行學生視力檢查時，下列何項敘述不正確？  
(A)視力檢查時，應請學生站於距視力表 2~3 公尺之距離 (B)測量時兩眼應分別檢查 (C)學生配戴眼鏡者，應先檢查裸眼視力，再測矯正視力 (D)對弱視學生，應轉介眼科作精密檢查
- 情況：為了增進學校員工健康，校護提出一份「尼昆國中教職員工健康體能推展計畫書」。  
(請回答以下 33-34 題)
33. 校護欲分析參與者的學習成效，下列哪些項目適合作為指標？  
(A)教育、經濟、生活型態 (B)信仰、習慣、文化  
(C)認知、情意、行為 (D)性別、年齡、健康狀況
34. 校護對於參與者的體能狀況評量，不包括下列何項？  
(A)心肺耐力 (B)肌力與肌耐力  
(C)柔軟度 (D)反射性調節
35. 校護面對罹患砂眼的蘇同學，提供的衛教內容何者有誤？  
(A)提醒常洗手、不隨意揉擦眼睛 (B)我國所採用的砂眼治療法是依照世界衛生組織規定的「間歇療法」  
(C)可用四環黴素 (Tetracycline) 或土黴素 (Terramycin) 眼藥膏治療  
(D)「間歇療法」連續定期間歇治療 12 次 (1 年) 共 60 個治療天
36. 學校衛生護士應了解國小一年級學童需接種的疫苗，不包括下列何者？  
(A)小兒麻痺口服疫苗 (B)麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (C)水痘疫苗 (D)日本腦炎疫苗
37. 六年級的大得在學校籃球場不慎扭傷了足踝，同學急忙到健康中心找護理師幫忙，下列何者是正確的處置過程？  
(A)現場應先給予熱敷以消腫 (B)48 小時之後，協助冰敷以防水腫 (C)保護患處，避免再次傷害 (D)受傷後 48 小時內，協助同學多活動足踝，促進消腫
38. 六年級的妮妮因為參加畢業考試過度緊張，大口呼吸卻仍覺得呼吸困難，此時她可能會因換氣過度而出現下列何種問題？  
(A)呼吸性鹼中毒 (B)呼吸性酸中毒  
(C)代謝性鹼中毒 (D)代謝性酸中毒
39. 蓓蓓抱怨教室靠近建築工地，吵雜聲常引起頭痛，學校護理人員進行教室噪音評估，標準是最高不得超過：  
(A) 30 分貝 (B) 60 分貝  
(C) 90 分貝 (D) 100 分貝

40. 下列有關兒童視力保健的敘述，那一項是不正確的？  
 (A)近年來臺灣學生近視的嚴重性並不單是近視人數「多」，而且近視度數「深」 (B)長時間、近距離的用眼活動造成台灣學童近視與日俱增的狀況 (C)愈小年齡得近視，由於其眼球的發育尚未完全，其近視增加的速度較快 (D)學童視力保健應強調，閱讀書刊時保持 25 公分以上距離
41. 下列有關校園結核病防疫重點，哪一項不正確？  
 (A)調查患者的接觸者 (B)把具傳染力的患者隔離治療 (C)追蹤患者家屬 (D)發生結核病疫情時，需公告個案以進行接觸者隔離
42. 下列有關兒童施打流感疫苗的敘述，哪一項不正確？  
 (A)國內外上市的流感疫苗無法提供 6 個月以下嬰兒施種 (B)通常在每年的十月是開始施打的時間 (C)流感疫苗和 H1N1 疫苗要分開施打 (D)平平 6 歲，從未打過流感疫苗，第一次要施打流感疫苗，應施打兩劑，第 1 劑與第 2 劑應間隔 1 個月
43. 八歲的安安因為感染水痘而住院，下列有關安安的醫療措施和護理處置，哪一項是不正確的？  
 (A)不可使用 aspirin 退燒  
 (B)應使用抗生素  
 (C)護理人員接觸病童時應戴口罩、手套、穿隔離衣  
 (D)採空氣隔離，住院期間需入住負壓隔離室，至所有水泡結痂為止
44. 兒童感染新型流行性感感冒時應謹慎避免重症的發生，下列哪一項敘述不正確？  
 (A)學齡期兒童是高危險群 (B)感染新型流感兒童之危險徵兆包含呼吸急促或困難、缺乏意識、不容易喚醒及活動力低下 (C)新型流行性感感冒於 48 小時內使用克流感，可縮短病程和降低其嚴重度 (D)一歲以下幼兒不建議使用克流感
45. 最近歐洲國家通報的大腸桿菌病例為腸道出血性大腸桿菌感染症，疫情已引起全球關注，下列有關該感染的敘述，何者不正確？  
 (A)病菌可通過人、食物、水和直接接觸動物等形式傳播 (B)腸出血性大腸桿菌可導致出血腹瀉和腹部疼痛，甚至併發溶血性尿毒症 (C)腸道出血性大腸桿菌感染症不是法定傳染病，不須通報 (D)感染可能造成急性腎功能衰竭
46. 下列有關兒童鉛中毒之描述，何者不正確？  
 (A)常發生在學步兒  
 (B)可能會影響兒童的生長，造成永久性的傷害  
 (C)通常是急性傷害，難以預防  
 (D)營養不良可能會增加鉛中毒的機會
47. 二歲的咪咪和媽媽到小兒科門診看病，護理人員在指導咪咪的媽媽有關意外事件的預防，下列何者最合適？  
 (A)教咪咪不可以將任何東西塞入鼻孔 (B)限制咪咪的活動 (C)教導咪咪哪些是危險物品 (D)移開咪咪的活動範圍內危險物品
48. 下列有關給兒童給藥護理之敘述，何者不正確？  
 (A)給藥的劑量主要是依據兒童年齡、體表面積、體重而決定 (B)對 2 歲以下幼兒行肌肉注射，應選擇後臀肌為注射部位 (C)為 3 歲以下的兒童滴耳藥，應將耳廓向下及往後拉，使耳道平直 (D)為學齡前期兒童直腸給藥時，應事先解釋，以減少恐懼
49. 下列有關性早熟的敘述何者不正確？  
 (A)男孩在九歲以前，女孩在八歲以前如出現性徵的發展則稱為早熟型，需要予以查明 (B)性早熟患孩因早期直線生長加速，會出現骨齡的提早融合 (C)塑化劑是一種環境荷爾蒙，易造成女童性早熟 (D)性早熟的治療可在每日睡前給予口服藥物治療
50. 先天性甲狀腺功能低下(congenital hypothyroidism)兒童的照護，最重要的護理措施應為下列那一項？  
 (A)早期發現疾病 (B)促進親子之間的互動  
 (C)為病童的心智遲緩安排轉介 (D)幫助父母面對孩子的未來
51. 下列腦性麻痺兒童之敘述，何者不正確？  
 (A)腦性麻痺是中樞神經受到永久的傷害  
 (B)腦性麻痺兒童有神經運動功能障礙  
 (C)早期療育非常重要  
 (D)主要缺陷是智能障礙
52. 下列有關兒童遺尿的敘述，何者不正確？  
 (A)常見泌尿道構造缺失引起  
 (B)泌尿道感染的徵兆之一  
 (C)可用藥物控制  
 (D)糖尿病的徵兆之一
53. 七歲的小明因肺炎而住院，下列有關的護理措施，哪一項是不正確的？  
 (A)鼓勵小明休息 (B)鼓勵小明平躺  
 (C)採高熱量飲食 (D)增加液體的補充
54. 護理人員在兒科門診進行團體衛教，指導有關玫瑰疹的注意事項，下列敘述何者不正確？  
 (A)急性細菌感染的一種 (B)好發於兩歲以下的幼兒  
 (C)突發性高燒 (D)皮疹為特殊症狀之一
55. 護理人員在兒科門診進行有關熱性痙攣之衛教，下列敘述何者不正確？  
 (A)因中樞神經系統之感染而引起 (B)發展成癲癇的可能性很低 (C)好發年齡為三個月到五歲 (D)很少引起腦部傷害
56. 下列有關兒童的缺鐵性貧血的敘述，何者不正確？  
 (A)溶血性貧血 (B)血紅素降低 (C)嬰幼兒的長期貧血可能導致無法挽回的腦部損傷 (D)口服鐵劑治療
57. 小明因騎自行車摔倒而造成骨折住院，醫囑必須上石膏治療，以下有關上石膏兒童的護理的敘述，何者正確？  
 (A)等上石膏 24 小時後再改變姿勢  
 (B)在石膏乾燥的過程中利用毛巾覆蓋以防破壞  
 (C)保持石膏邊緣平滑  
 (D)當石膏完全乾燥後才抬高四肢

58. 請問下列哪一種疫苗未包括在臺灣兒童常規的預防接種？(A)水痘疫苗 (B) A 型肝炎疫苗 (C)麻疹疫苗 (D)日本腦炎疫苗
59. 免疫機能受到嚴重抑制的兒童，不可接受下列那一種疫苗？  
(A)水痘疫苗 (B)DPT (C)B 型肝炎 (D)日本腦炎
60. 丹佛發展測驗的目的是為了測量幼兒的何種能力？  
(A)智商 (B)情緒發展  
(C)社會和身體的能力 (D)運動體適能
61. 青少年最常見的事故傷害為何？  
(A)跌落 (B)燒燙傷 (C)車禍 (D)溺水
62. 下列有脊椎側彎的敘述，何者不正確？(A)通常發生於青少年期 (B)以男性居多 (C)病發初期常不易察覺 (D)選擇能平衡背肌、腹肌的運動，例如游泳
63. 護理人員指導氣喘病患使用定量吸入器 (MDI) 式的藥物時，應採取下列哪一種呼吸方式？  
(A)快而淺的呼吸 (B)慢而深的呼吸  
(C)快而深的呼吸 (D)慢而淺的呼吸
64. 社區護理人員發現今年某社區結核病死亡病例較去年為多，為確定是否構成該社區健康問題，下列何措施應最先採用？  
(A)分析結核病死亡病例死亡時間  
(B)分析結核病死亡病例之年齡分布  
(C)比較社區內結核病死亡病例數是否較鄰地高  
(D)比較社區今年結核病死亡率是否高於往年
65. 目前行政院衛生署國民健康局推展的各年齡層健康促進活動，主要強調下列哪一種決定健康的要素？  
(A)環境因素 (B)生物因素 (C)生活型態(D)健康服務
66. 下列有關智能不足的敘述，何項正確？  
(A)智能不足輕度者無法教育  
(B)智能不足輕度者智商為 70~80  
(C)智能不足中度者是可訓練的  
(D)智能不足極重度者智商為 30 以下
67. 下列有關自閉症的描述，何者最恰當？  
(A)善於模仿學習 (B)乃廣泛性發展障礙 (C)行為治療為唯一的治療方式 (D)通常在三歲後發病
68. 有關腸病毒群感染(Enterovirus Infection)的臨床表徵，下列症狀何者最不會出現？  
(A)疱疹性咽峽炎(Herpangina)  
(B)急性心肌炎(Acute Myocarditis)  
(C)腹瀉(Diarrhea)  
(D)無菌性腦膜炎(Aseptic Meningitis)。

情況：現就讀小一的張小弟，幼年時被診斷為癲癇(Epilepsy)，定期於醫學中心門診追蹤，並持續服用抗癲癇藥物(Tegretol)。請回答以下 69-70 題：

69. 某日張小弟於學校操場上體育課時，突然癲癇發作，出現兩眼上吊、口吐白沫、全身強直性痙攣之情形，請問下列處理措施中何者為非？  
(A)先讓其平躺並移開四周之危險物  
(B)將毛巾捲軸放入口腔以防舌頭咬傷

- (C)將頭部側向一邊以保持呼吸道通暢  
(D)發作過程需有人陪伴以確保安全
70. 張小弟長期服用抗癲癇藥物(Tegretol)，應避免吃何種食物以防產生交互作用？  
(A)葡萄柚 (B)酒 (C)人蔘 (D)碳酸汽水
71. 下列何者為最常見的先天性心臟病？  
(A)心室中隔缺損(Ventricular Septal Defect, VSD)  
(B)心房中隔缺損(Atrial Septal Defect, ASD)  
(C)主動脈瓣狹窄(Aortic Stenosis, AS)  
(D)肺動脈瓣狹窄(Pulmonic Stenosis, PS)
72. 服用毛地黃(Digoxin)治療心臟衰竭之作用，下列何者正確？  
(A)加強心跳速率 (B)加強心肌收縮  
(C)減少尿量排出 (D)加強腎排尿功能
73. 針對特發性血小板減少性紫斑症(Immune Thrombocytopenic Purpura)的描述，下列何者為非？  
(A)病因主要與本身的免疫功能有關 (B)治療方式主要為類固醇療法和脾臟切除術 (C)需限制病人活動，以減少意外傷害 (D)建議以軟毛牙刷替代牙線的使用
74. 以下何者是不會傳染 HIV 的情形或環境？  
(A)游泳池 (B)課桌椅、運動器材或遊戲區玩具  
(C)馬桶、公共廁所 (D)以上皆不會傳染
75. 當一位 HIV 感染的學童在學校受傷，其血液滴在地上及桌面該如何處理？  
(A)用衛生紙擦拭 (B)以熱水用力擦拭  
(C)用家用漂白水及清水徹底清洗 (D)清水擦拭即可
76. 小二的小華自出生後皆有定期接種疫苗，今在校跌倒導致右手臂約 2 公分的撕裂傷，送至醫院縫合傷口，請問下列措施何者正確？(A)需要注射破傷風疫苗 (B)需要注射破傷風免疫球蛋白 (C)不需要注射任何破傷風疫苗 (D)由小華父母決定是否要注射
77. 當學校發生疑似傳染病個案時，應及時通知下列那一個單位？  
(A)轄區派出所 (B)轄區衛生局  
(C)疾病管制局 (D)健保局
78. 當學童有出現發燒及呼吸道感染症狀時的處理方式，下列何者不適切？  
(A)通知家長送醫 (B)給學童戴上口罩  
(C)詢問病童的接觸史 (D)給予退燒後再回教室上課
79. 以下何者不是登革熱之症狀？  
(A)頭痛 (B)後眼窩痛 (C)出疹 (D)腹瀉
80. 登革熱為第幾類的法定傳染病？向當地主管機關報告的時效為何？  
(A)第二類，24 小時 (B)第二類，48 小時  
(C)第三類，72 小時 (D)第四類，72 小時
81. 急性闌尾炎好發於學齡期兒童，請問典型症狀是(1)腹痛(2)嘔吐(3)發燒(4)草莓便  
(A) (1)(2)(3) (B) (2)(3)(4)  
(C) (1)(2)(4) (D) (1)(2)(3)(4)
82. 病童懷疑為盲腸炎時，以下何項護理措施不宜？  
(A)採半坐臥 (B)局部冷敷(C)清潔灌腸 (D)禁食

83. 林同學因急性腸胃炎及嚴重嘔吐住院，此狀況最易發生之酸鹼不平衡為何？  
(A)代謝性鹼中毒 (B)代謝性酸中毒  
(C)呼吸性鹼中毒 (D)呼吸性酸中毒
84. 依據 2010 公布的急救程序，下列何者正確？①Airway 暢通呼吸道 ②Breathing 建立呼吸 ③Compressing 心外按摩④叫病患並呼救  
(A) ①→②→③→④ (B) ①→④→②→③  
(C) ④→①→②→③ (D) ④→③→①→②
85. 下列何項不是兒童癌症的警徵？  
(A)唇色發紺 (B)紫斑或出血  
(C)不明原因之發燒 (D)肝脾腫大
86. 有關兒童虐待所形成的身體傷害，下列何項最不可能為兒童虐待所造成的情況？  
(A)掉一顆智齒 (B)大腿有超過 3 公分短列橢圓形齒痕，橢圓中心為瘀青 (C)身體的不同的區域有多處的挫傷，而且新傷舊傷雜陳 (D)手臂上似有香煙頭的燙傷痕跡
87. 小甜甜今年 7 歲，就讀國小一年級，身高是 120 公分、體重是 40 公斤，下列敘述何者為非？  
(A)BMI 是 27.8 (B)小甜甜的標準體重應在 33 公斤以下 (C)小甜甜的體重是屬於正常 (D)小甜甜的體重是屬於過重
88. 皮亞傑將人的認知發展分成 4 個時期，學齡兒童屬於下列那一個時期？  
(A)感覺運動期 (B)運思前期  
(C)形式運思期 (D)具體運思期
89. 校園有腸病毒發生時，可用何種溶液進行終期消毒？  
(A)0.06% 漂白水 (B)75% 酒精水  
(C)0.1% Lysol (D)10% Cidex
90. 有關中耳炎的描述，下列何者有誤？  
(A)兒童感冒、鼻竇炎或腺樣體肥大發炎常會併發中耳炎  
(B)中耳炎是造成兒童聽力損傷最常見的原因  
(C)診斷是以耳鏡來檢查耳膜是否紅腫、耳膜裏面是否有積液  
(D)若已退燒且不再抱怨耳朵疼痛，應盡速停止服用抗生素
91. 下列何者不屬於肺結核治療第一線藥物？  
(A)Isoniazid (B)Rifampin  
(C)Pyrazinamide (D)Ampicillin
92. 在停止肺結核病人呼吸道隔離前，應先確認下列何種情況？(A)痰液抹片耐酸性染色(Acid-fast stain, AFS)呈陰性反應 (B)胸部 X 光空洞消失 (C)結核菌素皮膚試驗呈陰性反應 (D)體溫回復正常範圍
93. 有關消化性潰瘍的描述，下列何者有誤？  
(A)幽門螺旋桿菌(Helicobacter Pylori)的感染是常見的原因之一  
(B)十二指腸潰瘍特別會發生在是剛吃完飯後  
(C)胃鏡檢查為目前最有效之診斷工具  
(D)常發生在胃或十二指腸，僅有少數發生在食道

94. Wald (1981)在其所著作的「學校護理」中提出，學校衛生護理的概念模式不包括下列那一項？  
(A)公共衛生 (B)系統化過程  
(C)信任關係 (D)適應過程
95. 根據學校衛生法，某市立中學現有 36 個班級，請問至少應設置幾位護理人員？(A)一 (B)二 (C)三 (D)四
96. 當學校護理人員發現某班有一學生連續咳嗽兩週以上時，應先進行以下何種措施？  
(A)通知家長建議立即就醫，接受胸部 X 光及驗痰檢查  
(B)通知家長幫學童請假在家靜養，以免傳染他人  
(C)立刻給予該班所有學生做預防性投藥  
(D)請該同學至隔離教室上課

情況題：王小妹，八歲，因初診斷為急性淋巴性白血病(Acute Lymphoblastic Leukemia, ALL)住院治療中，請回答以下 97-99 題：

97. 王小妹的急性淋巴性白血病，下列何項檢查是確定診斷依據？  
(A)核磁共振 (B)骨掃描 (C)抽血 (D)骨髓穿刺
98. 依據台灣小兒腫瘤治療群(Taiwan Pediatric Oncology Group)發展的治療計畫，王小妹的 ALL 是屬於何種風險分類？治療期間約需多久？  
(A)標準危險群，一年 (B)標準危險群，兩年  
(C)高危險群，一年 (D)高危險群，兩年
99. 王小妹住院治療三週了，期間護理人員發現王小妹只要精神稍微好一點便開始寫功課，下列分析、措施何者不恰當？  
(A)鼓勵她臥床休息，以免過於疲累 (B)此符合 Erikson 的勤勉階段表現 (C)可以協助安排床邊老師教學指導 (D)尊重其寫功課並給予讚賞鼓勵
100. 為學童進行淋巴結檢查之敘述，下列何項正確？  
(A)健康人身上經常可觸診到頸部淋巴結 (B)正常淋巴結是不動的 (C)正常淋巴結觸診時有壓痛感 (D)腹部淋巴結共有八群

※ 本試卷共 100 題、計 5 頁

☺☺☺☺☺ 敬祝金榜題名 ☺☺☺☺☺