

注意事項：1.本試卷共 100 題、計 6 頁，請仔細檢查並注意題號、頁數，確認後開始作答。
2.一律於答案卡上作答，如未依規定塗寫不予計分。
3.配分方式：每題 1 分，答錯不倒扣，共 100 分。

- 1.生理回饋（biofeedback）最不適用於下面何種疾病？
(A)緊張性頭痛（tension headache）
(B)思覺失調症（schizophrenia）
(C)氣喘
(D)心律不整
- 2.下列到健康中心的學生中，何者應優先處理？
(A)在走廊滑倒由同學扶入健康中心的六年級學生
(B)被同學用鉛筆畫傷手背的一年級學生
(C)早上腸胃炎嘔吐休養後返回教室，但仍感噁心的四年級學生
(D)上週外傷縫合來換藥學生
- 3.依據學生健康檢查手冊之規定，下列何者不是國小學童口腔檢查重點項目？
(A)未治療齲齒
(B)已治療齲齒
(C)未萌發齒
(D)恆牙第一大白齒齲齒經驗
- 4.有關協助學生健康檢查之尿液檢查的說明，下列敘述何者正確？
(A)女性只要月經結束後 3 天即可收集
(B)就寢前應多喝水，以利次日尿液之收集
(C)為避免憋尿不適，檢查前一晚多喝富含維生素 C 的飲料
(D)就寢前，排空膀胱
- 5.學校進行水耕植物的課程，學校護理人員提出「避免積水容器孳生病媒蚊」的建議，此為三段五級中的哪一階段？
(A)第一段第一級 (B)第一段第二級
(C)第二段第三級 (D)第四段第五級
- 6.有關癲癇發作時的處理方式，下列敘述何者正確？
(A)將毛巾塞進患者口中，防止其咬傷舌頭
(B)頭部下方放枕頭或軟墊加以保護
(C)強行壓住患者雙肩，避免因過度抽搐導致骨折
(D)立即協助個案採半坐臥式，以避免吸入性肺炎
- 7.若腦中風病人出現認知（cognition）功能失常及行為改變，其病變位置最常發生在下列何部位？
(A)額葉 (B)頂葉
(C)顳葉 (D)枕葉
- 8.依三段五級預防概念，下列何者為末段預防之工作？
(A)辦理團體衛生教育
(B)學生健康檢查
(C)愛滋病宣導
(D)高度近視個案管理
- 9.有關蟯蟲（Enterobius vermicularis）感染的敘述，下列何者錯誤？
(A)蟲卵可藉空氣傳播進而感染人體
(B)感染後易干擾夜間睡眠
(C)婦女感染後可能會引起骨盆腔腹膜炎
(D)最正確的診斷方式是檢查患者糞便中的蟲卵
- 10.下列哪條神經受影響是造成腕道症候群的主因？
(A)尺神經 (B)正中神經
(C)橈神經 (D)腕神經
- 11.有關長期照護與醫療照護之比較，下列敘述何者錯誤？
(A)長期照護主要的對象為慢性病患或身心障礙之失能或失智者
(B)醫療照護對象包括急性病患與慢性病患
(C)長期照護以機構式照顧為主
(D)醫療照護主要為治療疾病
- 12.下列何種物質長期濫用後，較不會產生戒斷症狀？
(A)幻覺劑（hallucinogen）
(B)安非他命（amphetamine）
(C)苯二氮平（benzodiazepine）
(D)酒精（alcohol）
- 13.有關自殺的敘述，下列何者正確？
(A)男女性自殺企圖（suicide attempt）與自殺死亡（completed suicide）率皆差不多
(B)自殺企圖男性比女性多，自殺死亡女性比男性多
(C)自殺企圖男性比女性多，自殺死亡也是男性多
(D)自殺企圖女性比男性多，自殺死亡男性比女性多
- 14.自殺風險評估之因子中，下列何者屬於相對低風險？
(A)鰥寡
(B)衝動性之自殺行為
(C)自責
(D)上吊或跳樓
- 15.兒童早發性齲齒（Early Childhood Caries，ECC）好發於何處？
(A)上顎乳門牙與上、下第一乳白齒
(B)下顎乳門牙與上、下第一乳白齒
(C)上、下顎乳門牙與上、下第一乳白齒
(D)下顎乳門牙與上顎第一乳白齒
- 16.哪些情況易引起血壓假性偏低？①壓脈帶太寬；②壓脈帶太窄；③受測肢體高於心臟；④受測肢體低於心臟；⑤壓脈帶包裹太緊；⑥壓脈帶包裹太鬆。
(A) ①③⑤
(B) ②④⑥
(C) ①③⑥
(D) ②④⑤

17. 有關登革熱的敘述，下列何者錯誤？
(A)病患會有雙峰型發燒
(B)被病媒蚊咬到後，其潛伏期為 10~20 天
(C)發病後，疹子最先出現在胸部和軀幹，之後擴散到四肢和臉部
(D)病患會感到腸胃不適
18. 抗結核病藥物中，何者在服用後尿液會變成橘色？
(A) Isoniazid
(B) Ethambutol
(C) Rifampin
(D) Streptomycin。
19. 抗心律不整藥物中，下列何者會引起支氣管痙攣？
(A) Inderal
(B) Isoniazid
(C) Mexitil
(D) Xylocaine
20. 護理師要為吳小弟打針時，吳小弟宣稱等他吃飯後才要打，結果當護理師用具準備妥後，他又說要上廁所，一直找理由來拖延打針，這種行為屬於下列何項？
(A)逃避性行為
(B)不合作性行為
(C)攻擊性行為
(D)退行性行為
21. 下列何種傳染性疾病要戴口罩？
(A)破傷風
(B)麻疹
(C)脊髓灰白質炎
(D)單純疱疹
22. 有關小兒感染腸病毒的敘述，下列何者錯誤？
(A)病毒存在喉嚨 3-5 天
(B)其傳染途徑主要為飛沫及接觸傳染
(C)可能會引起手足口病或疱疹性咽峽炎
(D)小兒麻痺病毒亦是腸病毒的一型
23. 罹患川崎氏症(Kawasaki disease)的病童會造成下列哪一個器官出現嚴重合併症？
(A)肺臟 (B)肌肉骨骼
(C)腎臟 (D)心臟
24. 下列何種胎兒異常無法藉由絨毛膜採樣檢查驗出？
(A)唐氏症
(B)中樞神經管缺損
(C)透納氏症候群
(D)海洋性貧血
25. 雅卉 9 歲，因罹患癲癇而連續服藥達三年，最近一年半均未再發作，因學校開始要上游泳課，您建議母親與體育老師討論的內容，下列何項較恰當？
(A)可與其他同學相同，不須特別注意
(B)可游泳，但當日上午須加服一劑抗癲癇藥物
(C)可游泳，但勿單獨在池內，須有人陪伴
(D)尚在治療中，不宜上游泳課
26. 協助病人側臥時，須以枕頭支托的部位，下列何者最合宜？
(A)頭下、膝下、臀部、踝部
(B)頸部、髖部、小腿腹、踝部
(C)頸部、腰部、下側腿、足背
(D)頭下、胸前、兩腿間、背部
27. 下列何者並非拐杖的使用原則？
(A)手肘必須彎曲 45~60 度
(B)拐杖與腋窩約距 2 指寬
(C)以手握扶把，手腕背屈
(D)不可將身體重量放於腋下
28. 妄想性疾患(delusional disorder)常對他人缺乏信賴感，此類病患常以何種防衛機轉來處理內心的衝突？
(A)合理化(rationalization)
(B)退化(regression)
(C)認同(identification)
(D)外射(projection)
29. 我國優生保健法中，有關人工流產實施的相關規定，下列敘述何者錯誤？
(A)因懷孕或生產將影響其心理健康或家庭生活者
(B)因被性侵害而受孕者
(C)本人或其配偶患有傳染性疾病者或精神疾病者
(D)本人或其配偶之五等血親內患有礙優生之遺傳性疾病者
30. 有關各類物質濫用的特性，下列敘述何者正確？①所謂強姦藥(FM2)是種中樞神經興奮劑；②酒精戒斷容易出現視幻覺；③鴉片戒斷時會有瞳孔放大的現象；④BZD(benzodiazepines)類藥物中毒時產生痙攣。
(A) ①② (B) ②③
(C) ③④ (D) ①④
31. 王先生因精神分裂症入院，自住院後一直不敢目視工作人員，且不敢走出病房進餐或參與病房之活動，常坐在房間中之一角，下列敘述何者為護理人員與其建立人際關係之重點？
(A)詳細解釋病房常規，以教導其適應環境
(B)督促病患參予團體活動，作為增進社會化之參考
(C)持續提供關懷，引導病患注意外界護理人員之存在與關心
(D)尊重病患之自由，避免給予病患壓力
32. 有關抗癲癇藥物之使用原則，下列敘述何者錯誤？
(A)藥物選擇依癲癇分類而定
(B)藥物應逐漸增量而非馬上給予最高劑量
(C)使用兩種藥物優於單一藥物，避免發生抗藥性
(D)藥物在體內之代謝速率有個別差異
33. 有關兒童施打流感疫苗的敘述，下列何者錯誤？
(A)每年通常約在 10 月開始施打
(B)目前接種的流感疫苗無法提供 6 個月以下嬰兒施打
(C)8 歲以下初次接種的兒童，應施打兩劑，且兩劑之間應間隔 1 個月
(D)施打流感疫苗後，需要約 2 天時間讓體內抗體上升

- 34.下列何者不是結核病（tuberculosis）的特徵？
(A)肉芽腫性發炎是其組織學特徵
(B)岡氏複合體（Ghon complex）是原發性結核的特徵
(C)續發性結核好發於肺下葉底部
(D)結核（tubercle）中出現乾酪性壞死是其組織學特徵
- 35.有關執行股外側肌肌肉注射的敘述，下列何者正確？
(A)適用於2歲內之幼童
(B)注射部位為恥骨聯合至膝蓋之中間1/3處
(C)注射時個案較宜採俯臥，以利注射
(D)注射時可將腳趾向內，髖關節內轉來放鬆肌肉
- 36.下列何者是活性細菌疫苗？
(A)卡介苗
(B)百日咳
(C)白喉
(D)破傷風
- 37.有關重型海洋性貧血兒童的敘述，下列何者正確？
(A)屬於女性基因（X 染色體）遺傳，主要發病於男性
(B)屬於體染色體隱性遺傳，會發生溶血性貧血的症狀
(C)若父母都是帶因者，就有一半機會產下重型海洋性貧血嬰兒
(D)嬰兒出生時即有貧血現象，會呈現臉色蒼白、身體虛弱無力現象
- 38.下列何項傳染病應於24小時內向主管機關報告？
(A)百日咳 (B)破傷風
(C)水痘 (D)桿菌性痢疾
- 39.氣喘病患血液中的何種細胞會明顯增加？
(A)嗜伊紅性白血球
(B)嗜鹼性白血球
(C)嗜中性白血球
(D)淋巴球
- 40.有關藥物管理方式之敘述，下列何者錯誤？
(A)外用、內服藥應分開放置
(B)當標籤不清楚時，應丟棄或送回藥局
(C)疫苗、血清、栓劑及肝素應放置冰箱
(D)急救藥品、鴉片類及麻醉劑均應上鎖及登記
- 41.執行眼藥滴入時，下列敘述何者錯誤？
(A)需將個案下眼瞼往下拉
(B)兩種藥水同時使用時，需間隔3~5分鐘以上
(C)應將藥物滴於角膜，以利吸收
(D)滴入後若有多餘藥水，可用棉球去除多餘藥水
- 42.下列何種脂溶性維生素缺乏時，易發生乾眼症或夜盲症？
(A)維生素K
(B)維生素E
(C)維生素D
(D)維生素A
- 43.適當的採光與照明對眼睛的健康很重要，一般在教室或書房閱讀時，需採用多少燭光（Lux）？
(A)100 Lux (B)300 Lux
(C)500 Lux (D)1,000 Lux
- 44.眼球的那個部位具有調整焦距的能力？
(A)鞏膜
(B)角膜
(C)虹彩
(D)水晶體
- 45.有關近視之敘述，下列何者正確？
(A)影像落在視網膜後
(B)眼球太短
(C)應使用凹透鏡矯正
(D)水晶體曲度太小
- 46.有關高熱症（hyperthermia）造成之傷害，下列何者與排汗停止有關？
(A)熱中暑（heat stroke）
(B)熱耗竭（heat exhaustion）
(C)熱痙攣（heat cramps）
(D)燒燙傷（burn）
- 47.注射鐵劑時，較建議採用何種注射方法？
(A)靜脈內注射 (B)Z字形注射
(C)皮下注射 (D)皮內注射
- 48.運動困難型腦性麻痺（dyskinetic cerebral palsy）兒童是腦部那一部位的功能受損？
(A)大腦皮質
(B)視丘核
(C)小腦
(D)基底核
- 49.杜仙氏肌肉萎縮症（Duchenne's muscular dystrophy）是何種蛋白的基因出現異常所導致的疾病？
(A)肌縮蛋白（dystrophin）
(B)肌動蛋白（actin）
(C)肌凝蛋白（myosin）
(D)結蛋白（desmin）
- 50.急性呼吸窘迫症候群（ARDS）患者出現廣泛性肺擴張不全，主要是因肺泡內水腫影響那一種肺泡細胞的生理功能？
(A)第一類細胞的氣體交換
(B)第二類細胞分泌表面張力素
(C)第三類巨噬細胞吞噬外來物
(D)柯恩氏孔（pores of Kohn）的氣體流通
- 51.依據兒童及少年福利與權益保障法第53條規定，醫事人員若發現兒童被虐待應於多久以內向主管機關通報？
(A)24小時
(B)36小時
(C)48小時
(D)72小時
- 52.下列何種細菌性食物中毒致死率最高？
(A)金黃色葡萄球菌
(B)黃麴黴菌
(C)肉毒桿菌
(D)沙門氏菌

- 53.有關學生體適能的描述，下列何者錯誤？
 (A)跑 800 公尺測量學生的心肺耐力
 (B)仰臥起坐測量學生的肌耐力
 (C)定期量血壓測量學生的血流動力學
 (D)坐姿體前彎測量學生的柔軟度
- 54.下列何者為單醣？
 (A)果糖 (B)蔗糖
 (C)乳糖 (D)肝醣
- 55.正常兒童右心房及右心室的含氧飽和度約為多少？
 (A) 40~50%
 (B) 55~65%
 (C) 70~75%
 (D) 90~95%
- 56.大量輸血後，會造成血液何種酸鹼值變化？
 (A)酸性血症 (B)鹼性血症
 (C)不變 (D)不一定
- 57.張小弟被診斷為蠶豆症（G-6-PD 缺乏症），張太太相當自責、哭泣，並表示害怕孩子會長不大。護理人員應告訴張太太避免讓張小弟接觸及食用會引起溶血的物品，下列何者不包含在內？
 (A)磺胺類藥物
 (B)抗瘧疾藥物
 (C)紅黴素類藥物
 (D)紫藥水
- 58.沙土被風吹進眼睛時，會覺得疼痛並迅速把眼睛閉起來，此反射牽涉到下列哪兩條顱神經？
 (A)顏面神經與動眼神經
 (B)滑車神經與外旋神經
 (C)三叉神經與顏面神經
 (D)動眼神經與外旋神經
- 59.在營養評估時，下列何項實驗數據表示患者可能有蛋白質攝取不足的情形？
 (A)白蛋白增加
 (B)血比容上升
 (C)尿素氮上升
 (D)淋巴球總數下降
- 60.呆小症是因新生兒缺乏何種激素，導致神經發育不全及心智遲緩？
 (A)腎上腺素（epinephrine）
 (B)甲狀腺素（thyroxine）
 (C)黃體促素（LH）
 (D)雄性素（androgen）
- 61.有關腦性麻痺兒童的敘述，下列何者錯誤？
 (A)出生前及生產時，若長時間腦部缺氧，均可能造成腦性麻痺
 (B)預防殘疾加重及增進運動功能，是腦性麻痺兒童的治療目標
 (C)約有 1/3 腦性麻痺兒童的智力不會受到影響
 (D)約有 2/3 腦性麻痺兒童會有漸進式的運動功能失常
- 62.關於麻疹（measles）的敘述，下列何者錯誤？
 (A)紅疹依序出現於耳後、髮際、前額及上頸部、上肢、軀幹至下肢
 (B)科氏斑點在發疹後第 2 天才逐漸減輕
 (C)病童自出疹後 5 天內需採腸胃道隔離
 (D)傳染期主要是在前驅期
- 63.下列那一項活動是屬於健康促進？
 (A)定期篩檢、提供特殊營養
 (B)婚前諮詢和性教育、提供安全之工作環境
 (C)傳染病的預防、篩檢、調查
 (D)個人衛生、致癌物質的防護
- 64.下列何項不是丹佛兒童發展測驗(Denver Developmental Screening Test)的評估項目？
 (A)粗細動作 (B)語言能力
 (C)社會化行為 (D)注意力及堅持度
- 65.下列何者是台灣 1~14 歲孩童最主要的死因？
 (A)惡性腫瘤 (B)自殺
 (C)事故傷害 (D)心血管疾病
- 66.下列何種疫苗屬於被動免疫？
 (A)注射類毒素
 (B)注射減毒疫苗
 (C)注射免疫球蛋白
 (D)注射基因工程疫苗
- 67.「NTU 亂點立體圖」是用來測試下列何者？
 (A)認知 (B)斜弱視
 (C)計算能力 (D)色盲
- 68.有關健康促進學校的敘述，下列何者較不正確？
 (A)制定學校衛生政策為首要步驟
 (B)強調學校社區化、社區學校化
 (C)配合國家政策推動由上而下的健康教學活動
 (D)目標為使學校成為健康生活的場所
- 69.有關代謝症候群危險因子之敘述，下列何者最正確？
 (A)男性腰圍 $\geq 90\text{cm}$
 (B)女性高密度脂蛋白(HDL) $\geq 60\text{mg/dL}$
 (C)收縮壓 $\geq 110\text{mmHg}$ /舒張壓 $\geq 85\text{mmHg}$
 (D)三酸甘油脂 $< 150\text{mg/dL}$
- 70.下列何種管制藥物常引起間質性膀胱炎，以致頻尿、漏尿、血尿等症狀，嚴重者甚至需要進行膀胱重建手術？
 (A)LSD 俗稱搖腳丸或一粒沙
 (B)Ketamine 俗稱 K 他命
 (C)FM2 俗稱強姦藥丸
 (D)Amphetamine 安非他命
- 71.社區護理師到社區訪視 75 歲高血壓的老人，並進行用藥指導。依照慢性病三段五級防治，此項措施屬於哪一層次？
 (A)第一級健康促進 (B)第二級特殊保護
 (C)第三級早期診斷與治療 (D)第四級限制殘障

- 72.一位成年人的後背及雙下肢後方被燒傷，依九法則(rule of nine)估計，其燒傷面積占體表總面積多少百分比？
(A)27
(B)36
(C)45
(D)54
- 73.有關休克的敘述，下列何者正確？
(A)神經性休克的原因為交感神經興奮，導致末梢血管收縮所致
(B)低血容積性休克的個案常有皮膚乾熱的徵象
(C)過敏性休克是一種抗原抗體反應，造成小動脈擴張及微血管通透性增加
(D)休克的病人宜採下肢放低 45 度及頭抬高的姿勢
- 74.有關肺結核接觸者的界定，下列敘述何者最正確？
(A)與個案接觸累積 10 小時
(B)與個案接觸累積 20 小時
(C)與個案接觸累積 30 小時
(D)與個案接觸累積 40 小時
- 75.當護理人員懷疑青少年個案有自殺的可能性時，應如何協助此青少年較為適當？
(A)和個案談輕鬆愉快的話題，以轉移其對自殺想法的注意力
(B)儘可能避免提及與自殺有關的內容，以避免強化他去從事自殺的動機
(C)鼓勵個案說出並討論他對自殺的看法與感受，並了解是否他已經有自殺計劃
(D)告訴個案他不應該有自殺的想法或舉動，否則將會使很多人傷心
- 76.以下哪一種診斷的病人容易合併發生自殺、憂鬱及物質濫用？
(A)焦慮症
(B)精神分裂症
(C)人格障礙
(D)躁鬱症
- 77.護理人員想獲得台灣法定傳染病最新的統計資料，應向衛生福利部的哪個單位查詢？
(A)流行病管制中心
(B)醫事司
(C)護理及健康照護司
(D)疾病管制署
- 78.南崁社區糖尿病盛行率 39%，高血壓盛行率為 26%，下列推論何者最正確？
(A)糖尿病的發生率高於高血壓
(B)糖尿病的新病患多於高血壓
(C)高血壓的死亡率高於糖尿病
(D)要管理的糖尿病病患多於高血壓病患
- 79.南崁社區年中人口數為 10,000 人，該年有 200 人罹患腸病毒，一年內有 100 人死亡，其中死於腸病毒有 20 人。下列敘述何者正確？
(A)粗死亡率為 20/10,000
(B)腸病毒死亡率為 20/100
(C)腸病毒致死率為 20/200
(D)標準化死亡率為(20/100)×10,000
- 80.有關台灣推動二代健康促進學校的特色，下列敘述何者錯誤？
(A)政府擬定年度重點
(B)建立實證式前測、後測的時效證據
(C)建立全國統一性指標
(D)最終目的為改變學生認知
- 81.有關台灣國中生視力不良的現況，下列敘述何者錯誤？
(A)視力不良率逐年上升
(B)弱視人數增加
(C)近視發生得太早
(D)高度近視比例過高
- 82.根據台灣現階段國民小學健康檢查實施辦法，下列何者屬於「視需要辦理」項目？
(A)血壓
(B)身高體重
(C)斜視
(D)脊柱側彎
- 83.有關學生發生熱衰竭之敘述，下列何者最不正確？
(A)進行呼吸道通暢評估
(B)症狀為皮膚燥熱、出汗
(C)依照學生意識狀況補充水分
(D)將學生移到陰涼處休息
- 84.針對台灣健康促進學校改善體位之措施，下列敘述何者最正確？
(A)訂定無肉日是屬於個人健康技能層面
(B)學校衛生護理人員定期協助學生測量腰圍與體位是屬於社會環境
(C)優質早餐店認證是屬於學校社區關係
(D)作息調整是屬於健康服務
- 85.下列哪一項為台灣目前學校護理人員最重要的工作？
(A)評估全校師生健康問題與需求
(B)補行預防接種
(C)環境清潔
(D)關懷弱勢學生健康
- 86.有關「二代全民健保」，下列敘述哪些是正確的？①屬於強制性投保；②須設籍滿 4 個月以上才能參加；③矯正機構收容人無法參加；④需要負擔部分醫療費用；⑤給付 10 次產前檢查；⑥給付 60 歲以上原住民每年一次成人預防保健
(A) ①④⑤
(B) ①②④
(C) ②④⑥
(D) ①③⑤

- 87.自閉症兒童患者常會表現重複性動作，下列措施何者最適當？
 (A)接受 (B)了解原因
 (C)對其動作給予鼓勵 (D)限制
- 88.長期吸安非他命(amphetamine)會造成精神病，其症狀與下列何項疾病類似？
 (A)躁鬱症 (B)妄想型精神分裂症
 (C)強迫症 (D)恐懼症
- 89.下列有關「物質濫用」之敘述，下列何者不正確？
 (A)海洛因戒斷症狀之一為瞳孔縮小
 (B)紅中為巴比妥鹽類，長期使用會產生生理依賴
 (C)安非他命中毒會產生心跳加快、血壓上升
 (D)安非他命產生的妄想症狀，以被害妄想最常見
- 90.下列何者較不是懷孕青少年之健康危險因子？
 (A)有較高早產的危險性
 (B)較晚開始接受產檢
 (C)可能伴有抽菸喝酒等行為
 (D)孕期體重增加太多
- 91.有關疥瘡的敘述，下列何者錯誤？
 (A)診斷的方法是刮下患處的皮屑，在顯微鏡下觀察
 (B)病人常有嚴重的搔癢，尤其在白天更嚴重
 (C)使用抗疥蟲藥物外，必須搭配衣物和用物的消毒，才能徹底根治
 (D)學校、軍隊、安養院、監獄等群居環境，皆是疥瘡好發的場所
- 92.有關一氧化碳中毒的症狀，下列何者錯誤？
 (A)噁心、嘔吐
 (B)皮膚及嘴唇呈桃紅色
 (C)呼吸有水果味
 (D)頭暈、視力模糊
- 93.大多數心臟猝死(Sudden Cardiac Death)之個案最常見的心律為何？
 (A)心室纖維顫動(Ventricular fibrillation)
 (B)心室停止(Asystole)
 (C)無脈搏的電氣活動(PEA)
 (D)完全性房室傳導阻滯(Complete A-V block)
- 94.有關預防骨質疏鬆症的護理指導，下列敘述何者最適當？
 (A)保持規律的負重運動
 (B)每天攝取 250 毫克的鈣離子
 (C)多攝取紅色與黃色蔬菜
 (D)每天喝一杯紅酒
- 95.王老師產檢時醫師建議作羊膜腔穿刺術，下列敘述何者錯誤？
 (A)最適合於妊娠 8~12 週執行
 (B)可檢查出胎兒染色體異常
 (C)可診斷胎兒的性別
 (D)可診斷胎兒是否罹患唐氏症
- 96.王老師懷孕 24 週，懷孕前體重適中，此次產前檢查測量得知目前體重較懷孕前增加 6 公斤，您建議其每日攝取熱量為何？
 (A)體重增加太多，須特別注意限制熱量的攝取
 (B)體重增加正常，維持非孕期時熱量的攝取
 (C)體重增加正常，提醒每日攝取熱量應較非孕期時增加 300 大卡
 (D)體重增加太少，建議每日攝取熱量增加 500 大卡
- 97.王小弟，15 個月大，被診斷為單純性熱性痙攣，下列敘述何者正確？
 (A)王小弟的痙攣會導致神經的永久性損害
 (B)單純性熱性痙攣的特色是四肢呈現不對稱的強直攣縮
 (C)誘發痙攣的因素是體溫急劇上升
 (D)王小弟的痙攣會持續 1 小時到數小時
- 98.小玉 6 歲，因上呼吸道感染引發扁桃腺炎，導致呼吸困難、無法吞嚥，而行扁桃腺切除術，下列術後護理措施何者正確？
 (A)鼓勵深呼吸及用力咳嗽，以利排痰
 (B)密切監測生命徵象及觀察吞嚥次數有無增加
 (C)鼓勵採仰臥的姿勢，以利觀察嘔吐的狀況
 (D)給予溫熱的流質或軟質飲食
- 99.有 172 位民眾接受某憂鬱量表篩檢與精神科專科醫師結構式精神科會談診斷。量表篩檢出有憂鬱傾向者有 22 位；醫師診斷出有憂鬱症者有 4 位；量表篩檢與醫師診斷均無憂鬱症者有 150 位(如下表)，請問此憂鬱篩檢量表的敏感性(sensitivity)為何？
- | 檢查結果 | 醫師診斷 | | 總計(人數) |
|------|------|-----|--------|
| | 有病 | 沒病 | |
| 陽性 | ? | ? | 22 |
| 陰性 | ? | 150 | |
| 總計 | 4 | | 172 |
- (A) 2.32%
 (B) 18.18%
 (C) 89.28%
 (D) 100%
- 100.承上題，此憂鬱篩檢量表的特異性(specificity)為：
 (A) 2.32%
 (B) 18.18%
 (C) 89.28%
 (D) 100%

本試卷共 100 題、計 6 頁

😊😊😊😊😊 敬祝金榜題名 😊😊😊😊😊

桃園市 105 年度學校護理人員及營養師暨公立幼兒園契約護理人員試務聯合甄選【護理人員】試題 標準答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	C	D	B	B	A	D	D	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	D	B	A	A	B	C	A	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	A	D	B	C	D	A	D	D	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	C	D	C	A	A	B	D	A	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	D	B	D	C	A	B	D	A	B
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	C	C	A	C	B	C	C	D	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
D	C	B	D	C	C	B	C	A	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	B	C	D	C	C	D	D	C	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
B	A	B	C	A	A	A	B	A	D
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
B	C	A	A	A	C	C	B	D	C