

桃園縣 103 年度學校護理人員暨附設幼兒園契約護理人員試務聯合甄選試題

注意事項：本試卷共 100 題、計 6 頁，請仔細檢查並注意題號、頁數，確認後開始作答
一律於答案卡上作答，如未依規定塗寫不予計分
配分方式：每題 1 分，答錯不倒扣，共 100 分。

- 下列何種案例是屬於三段五級預防中的第二段第三級？
(A) 黃同學久咳後接受胸部 X 光檢查
(B) 45 歲的都教授開車繫安全帶
(C) 中風個案陳爺爺經急性醫療服務後，接受復健治療
(D) 45 歲的馬太太加強鈣質攝取
- 有關預防幼兒安全及意外傷害之敘述，下列何者有誤？
(A) 避免讓幼兒穿太緊的衣服
(B) 幼兒洗澡時要先加熱水再倒冷水
(C) 避免蓋過多的被子或毯子
(D) 宜選擇有 ST 標誌的安全玩具
- 有關減輕經期腹部絞痛不適症狀之措施敘述，下列何者較為適當？
(A) 自行到附近藥局買止痛藥吃，方便又有效
(B) 運動會增加不適，建議經期間暫停所有的活動
(C) 教導採規律性、同方向環狀按摩下腹局部，來緩解肌肉痙攣
(D) 可用冰敷來減輕疼痛
- 下列何者為學校護士對於缺席的學生應進行的工作？
①與導師聯絡了解缺席原因 ②請學生配合校規儘速復學 ③進行家庭訪視 ④每班超過 5 人請病假時為疾病流行警訊
(A) ①②
(B) ①③
(C) ②④
(D) ③④
- 學校護士針對學校環境所作的評估，下列何項並不合乎學校衛生標準？
(A) 教室的窗戶面積至少為室內地板面積的 1/6
(B) 飲水機大腸桿菌培養 0 mg/dl
(C) 桌面高度為學生身高的 3/7
(D) 教室黑板的平均照度應不小於 500 米燭光
- 星星國小校護擬進行有關教職員代謝症候群防治的計畫案，推行步驟何者較為適當？①陳述代謝症候群的盛行率 ②擬定衛教方式，進行前測，與教務、總務、訓導單位合作 ③進行後測，測得教職員的知識、態度、行為 ④設定目標、優先次序與計畫 ⑤追蹤後續健康檢查的數值
(A) ①②③④⑤
(B) ⑤②①④③
(C) ①④②③⑤
(D) ④②①⑤③
- 教育部禁止高中及以下校園內不得販售高熱量、高油脂、高糖、高鹽及含咖啡因的飲品。此一措施與下列何者有關？
(A) 教育中立，避免商業利益輸送
(B) 強化健康服務，增進健康照護
(C) 透過健康教學，增加健康知識
(D) 營造注重健康的學校環境，落實健康生活化
- 下列那些要素，是屬於整體性學校衛生計畫 (comprehensive school health programs) 的內容？
①學校供膳 ②系統化過程 ③助人關係 ④學校教職員健康促進 ⑤學校諮商
(A) ①②③④⑤
(B) ①③④⑤
(C) ①④⑤
(D) ②③
- 在學校會議中向全校教職員倡導「健康飲食」，是屬於下列何種健康促進措施？
(A) 增強個人技巧
(B) 制度配合修訂
(C) 推動組織建立
(D) 增強社區行動力
- 關於學校衛生行政的敘述，何者有誤？
(A) 包括學生的安全維護、健康照顧、行為輔導、常規訓練等之政策制定與執行
(B) 由訓導處(學生事務處)全權負責，其他處室不應介入
(C) 應將衛生行政視為學校本位行政的一部分
(D) 能激發學校展現潛力和敬業的熱誠
- 有關台灣地區腸病毒流行概況的敘述，下列何者正確？
(A) 為台灣地區第二類應報告傳染病
(B) 腸病毒感染之傳染力，在發病後一週內是高峰
(C) 每年 1 至 2 月為流行高峰期
(D) 71 型是目前致病力最弱的一種
- 舉行衛生教育活動時，下列那個指標，是屬於衝擊評價的指標？
(A) 學生活動參與情形
(B) 活動內容、教材、場地等的安排情形
(C) 學生生活品質改善狀況
(D) 學生知識改善情形
- 有關水痘的敘述，下列何者有誤？
(A) 水痘約在出疹前 4 天，至出疹後 5 天為傳染期，其傳染性很強
(B) 水痘病毒經由直接接觸，或飛沫傳染所引起
(C) 水痘疫苗是一種高度活性的減毒疫苗，任何年齡皆適用於接種，其保護性可持續終身
(D) 得過後則終身免疫
- 以下有關青少年吸菸之相關敘述，何者正確？
(A) 年輕女性吸菸有減少的趨勢
(B) 根據菸害防治法之規定，未滿 20 歲者，不得吸菸
(C) 家長吸菸者，其子女在青少年時期開始吸菸的可能性較高
(D) 根據菸害防治法第二十四條之規定，高級中等以下學校全面禁菸
- 李護理師優先處理「骨折意外」的小都，而請導師先代為照顧「疑似感冒」的小千，其考量依據可能為何？
(A) 可利用資源
(B) 本身對問題的解決動機
(C) 本身的專業取向
(D) 問題的嚴重性

16. 下列敘述，何者為非？
(A) 海洛因屬於麻醉劑類
(B) 安非他命是一種幻覺劑
(C) FM2 屬中樞抑制劑
(D) 搖頭丸(MDMA)屬幻覺劑
17. 定期為學校學童檢查身高、體重、視力等，是屬於健康促進學校範疇中的那一個範疇？
(A) 學校的健康服務
(B) 學校的環境支持
(C) 健康教育與活動
(D) 學校的衛生政策
18. 依據傳染病防治法，當校護人員發現下列那些傳染病個案時，應於一週內向主管機關報告並勸導隔離治療？①日本腦炎 ②結核病③登革熱 ④桿菌性痢疾 ⑤流感併發重症
(A) ①②③④⑤
(B) ①②⑤
(C) ①②
(D) ②③
19. 在評估影響學童視力保健的相關因素時，根據格林(Green)之 PRECEDE-PROCEED 模式，下列何者是屬於使能因素(Enabling factors)？
(A) 校園內有特約眼科醫師例行性看診
(B) 老師對學童視力保健的重視
(C) 學童對於視力保健的認識
(D) 學童對於視力保健重要性的看法
20. 下列有關學校衛生法的描述，何者有誤？
(A) 於 91 年 2 月 6 日公布施行
(B) 本法所稱中央主管機關為教育部規定
(C) 學校應建立學生健康管理制度，定期辦理學生健康檢查
(D) 學生健康檢查之對象、項目、方法及其他相關事項之實施辦法，由地方主管機關自定之
21. 李護理師準備向學校教職員宣導登革熱注意事項，下列何者正確？
(A) 放在教室外的廢棄輪胎、積水容器等物品應清除與定期檢視是否有積水
(B) 病媒為三斑家蚊、環紋家蚊，這二種蚊喜於白天室外活動
(C) 潛伏期為 1~3 天，很少出現高燒，但會出現頭痛、肌肉痛、關節痛之不適
(D) 若學生出現酸痛發燒的症狀時，建議至醫院注射 aspirin 緩解其不適

情況：千送伊老師，38 歲，有代謝症候群且體型略胖。根據貝克(Becker)健康信念模式，依此回答下列第 22 題至第 23 題

22. 千老師表示「我和很擔心以後會像我父親一樣有高血壓」，此描述較符合哪種因素？
(A) 罹患性認知
(B) 自我效能
(C) 嚴重性認知
(D) 心理與社會因素
23. 千老師表示「在校護的衛教與鼓勵下，我開始天天運動」，此描述是對應何種因素？
(A) 自我效能
(B) 心理與社會因素
(C) 行動線索
(D) 利益性認知

24. 蔡小姐詢問校護有關婦女乳房自我檢查之時機之敘述，下列何項最正確？
(A) 每月經期結束後一週內，應做一次乳房自我檢查
(B) 沒有固定時間，隨時都可以自我檢查
(C) 懷孕期間或停經的婦女，則不需每月定期做乳房自我檢查
(D) 35 歲以上的婦女，需每 2 年定期做一次乳房 X 光攝影
25. 有關「登革熱」的敘述，下列何者正確？
(A) 登革熱細菌可分為 4 型
(B) 在台灣，重要的病媒蚊是三斑家蚊
(C) 典型登革熱致死率為 15~50%
(D) 感染 2 種或 2 種以上不同型的病毒重複感染，會造成出血性登革熱
26. 依重高指數評估的準則，若小荷同學重高指數為 0.85，那小荷是屬於何種體位？
(A) 過輕
(B) 正常
(C) 過重
(D) 肥胖
27. 近年政府進行組織改造後，我國主管規劃學校衛生政策事宜之行政單位是？
(A) 衛生福利部
(B) 綜合規劃司
(C) 疾病管制署
(D) 國民健康署
28. 學校護理人員為全校教職員生安排健康檢查，此時她扮演的角色為何？
(A) 諮商者
(B) 個案管理者
(C) 代言者
(D) 照護提供者
29. 下列有關健康促進學校的敘述，何者有誤？
(A) 結合衛生與教育二個體系
(B) 自 2001 年起教育部開始推動「學校健康促進計畫」
(C) 建立由上而下的帶動模式，老師、學生、家長及社區各司其職
(D) 建立良好的健康行為為最終目標
30. 宋倩老師在健康檢查後詢問吳校護代謝症候群高危險因子有哪些，下列何者正確？①空腹血糖 $\geq 100\text{mg/dl}$ ②高密度脂蛋白膽固醇偏高 $\geq 50\text{mg/dl}$ ③三酸甘油酯過高 $\geq 150\text{mg/dl}$ ④高密度脂蛋白膽固醇過低 ⑤腰圍過粗-女性 $\geq 70\text{cm}$
(A) ①②③④⑤
(B) ①③④
(C) ①②③
(D) ③④⑤
31. 下列有關學校衛生工作範圍的敘述，何者有誤？
(A) 追蹤並管理學生的體格缺點矯治工作
(B) 透過健康教育養成學生良好的衛生習慣
(C) 提供健康服務以促進教職員工生之健康
(D) 執行學生的急性傳染病治療工作
32. 敏浩國中有 400 位老師參加衛生所血壓篩檢活動，結果發現有 65 位篩檢出血壓偏高，經醫師複診後，結果有 22 位確定有高血壓問題，而其中有 3 位則是第一次確診，請問該校高血壓之盛行率為何？
(A) 16.3%
(B) 5.5%
(C) 21.8%
(D) 0.75%

33. 下列有關健康檢查的敘述，何者正確？
(A) 國民小學根據規定一、四年級實施健康檢查一次
(B) 可分為一般與特殊兩類
(C) 學生身高、體重、視力檢查，需由教師為之，且由學校護理人員協助實施
(D) 傳染性疾病項目如頭蝨、蟯蟲、肺結核，委由醫療機構全權處理
34. 胡老師，50 歲，適合她的運動強度約在 70%~90%，簡護理師應建議她運動時，最高心跳率維持在 1 分鐘多少次？
(A) 84~108
(B) 119~153
(C) 154~198
(D) 200~220
35. 下列何者不是我國兒童健康問題的趨勢？
(A) 因感染引起的死亡率仍然偏高
(B) 惡性腫瘤死亡率仍然偏高
(C) 事故傷害死亡率仍然偏高
(D) 先天性畸形死亡率仍然偏高
36. 體重過重之青少年在參加學校所舉辦的「減重營」後，下列何項最能展現減重的持續成效？
(A) 聽由校護安排「低熱量飲食」的系列講座
(B) 建議由校方提供低熱量之午餐
(C) 請導師協助監控午餐之進食量
(D) 討論如何與同學營造低熱量的飲食環境
37. 有關兒童成長與發展之敘述，下列何者為非？
(A) 是持續、依序的，並依循頭尾律及由中心向外發展的原則漸進發展的
(B) 3 歲兒童牙齒數目應為 20 顆
(C) 6 歲以前是神經系統發展最快速的時期
(D) 各個身體系統或器官成長的型態與速率相近
38. 小芳 9 歲，目前就讀小學三年級，下列何者不符合她現階段的認知發展特徵？
(A) 質量守恆概念
(B) 性別恆定觀
(C) 可逆性思考
(D) 抽象思考能力
39. 劉太太帶 15 個月大的妞妞到健兒門診接種預防注射，妞妞過去均依照時程完成接種，依照我國現行預防接種時程，今天妞妞會接受以下那一種疫苗？
(A) B 型肝炎疫苗
(B) 日本腦炎疫苗
(C) 白喉、破傷風、非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺，五合一疫苗
(D) 麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗
40. 有關因輪狀病毒(rotavirus)感染引起腸胃炎的敘述，下列何者正確？
(A) 好發於 6 個月~2 歲的嬰幼兒
(B) 主要傳染途徑為飛沫傳染
(C) 夏天的發生率較高
(D) 應鼓勵多喝牛奶來代替其他固體食物
41. 先天性代謝異常之嬰兒，若不及早診斷及治療必將造成腦組織的損傷而影響智力發展，下列之代謝疾病何者除外？
(A) 先天性甲狀腺低功能症
(B) G-6-PD 缺乏症
(C) 苯酮尿症
(D) 半乳糖血症
42. 有關哮喘之敘述，下列何者正確？
(A) 好發於學齡前期兒童
(B) 好發季節為夏天
(C) 最常引起的致病原為病毒
(D) 臨床三合一症狀為咳嗽如狗吠聲、聲音嘶啞、吐氣喘鳴音
43. 有關氣喘之敘述，下列何者正確？
(A) 大部分病童第一次發作年齡在 5 歲以後
(B) 臨床表徵為吸氣時有喘鳴聲(wheezing)
(C) 尖峰呼氣流量值小於 60%的預估值，即處於黃燈區
(D) 血液檢查結果，嗜伊紅性白血球(eosinophilia)總數增加，表示有外因性誘發因子存在
44. 有關川崎氏病(Kawasaki disease)之敘述，下列何者錯誤？
(A) 會持續發燒五天以上且使用解熱劑無效之臨床表徵
(B) 血液檢查顯示白血球、紅血球沉降率及血小板均減少
(C) 以 aspirin、類固醇或靜脈注射 γ 免疫球蛋白治療
(D) 可能會引起心臟血管方面的病變，如冠狀動脈瘤
45. 有關急性風溼熱病童之臨床表徵，下列何者正確？
(A) 心臟結構中最常受侵犯部位是三尖瓣及主動脈瓣
(B) 常會造成膝關節、肘關節變形
(C) 在軀幹、肢體遠心端會出現邊緣性紅斑
(D) 臉部及上肢肌肉出現無法控制的活動
46. 力宏 9 歲，因急性腎絲球性腎炎(glomerulonephritis)而入院，其尿液分析的結果為下列何項？
(A) 膿尿、血尿
(B) 血尿、蛋白尿
(C) 膿尿、尿比重上升
(D) 蛋白尿、尿比重下降
47. 有關熱性痙攣的敘述，下列何者正確？
(A) 好發於 7 歲以上的兒童
(B) 在夏季，兒童體溫會隨著環境溫度升高，而發生抽搐
(C) 痙攣發生於發燒 24 小時後
(D) 痙攣的特性呈現強直陣攣性(tonic-clonic)抽搐
48. 下列對於胰島素注射之敘述，何者正確？
(A) 9 歲以上兒童，可教導自我注射胰島素
(B) 吸收速度：腹部>臀部>手部>大腿
(C) 注射後加以按摩，可預防脂肪硬塊
(D) 胰島素開封後，可放在室溫約二個月
49. 小天今年 2 歲，因中耳炎住院，進行鼓膜切開引流術，下列指導何者正確？
(A) 為避免壓迫，鼓勵小天臥向健側
(B) 盡量側臥餵食牛奶
(C) 幫小天清外耳道時，耳朵要向上向後拉
(D) 手術後三個月內不可游泳，最好暫時停止潛水活動
50. 注意力缺損過動症(attention deficit hyperactivity disorder)的學童，關於其學習環境安排，下列敘述何者最適當？
(A) 學童上課的位置盡量靠近窗戶和走廊
(B) 安排學童在固定地點完成家庭作業
(C) 寫功課前盡量給予學童口頭指示
(D) 學習的內容不要事先安排，以維持彈性

51. 林小弟與繼母常衝突。林小弟對照顧他的護理人員表示：「妳好像我死去的媽媽一樣，耐心的包容我的任性，妳對我說的話，我比較聽得進去。」就治療性人際關係建立的過程，這是何種現象？
 (A) 正向情感轉移(positive transference)
 (B) 負向情感轉移(negative transference)
 (C) 正向情感反轉移(positive counter-transference)
 (D) 負向情感反轉移(negative counter-transference)
52. 下列有關青少年飲食疾患的描述，何者錯誤？
 (A) 厭食症的特徵是強烈的害怕變胖，拼命的追求纖瘦
 (B) 暴食症的特徵是無法自制地進食大量食物，伴隨出現不當的補償行為，如：催吐
 (C) 厭食症常會導致經血量過多
 (D) 暴食常伴隨著壓力性的生活事件
53. 依社會生態學的角度，下列哪些預防青少年吸菸的策略是屬於個人層次？①菸盒上的警語②學校教育吸菸的健康危害③建立青少年拒菸能力④禁止商家販售菸品給未成年者
 (A) ①②
 (B) ②③
 (C) ③④
 (D) ①④
54. 有關「2020 健康國民白皮書」中兩項重要總體目標，下列何者正確？①延長國人健康平均餘命 ②促進國人健康平等性 ③減少醫療成本 ④發展專科醫療
 (A) ①②
 (B) ③④
 (C) ①③
 (D) ②④
55. 下列有關依賴指數的敘述，何項正確？①依賴人口是指14歲以下及65歲以上之人口②依賴指數是總人口數對無生產力人口之負擔估測③依賴指數是每100個生產人口，需負擔幾個依賴人口的比數④所謂生產人口是指滿18歲以上的成年人
 (A) ①②
 (B) ①③
 (C) ①④
 (D) ②④
56. 下列何項最能解釋一個國家之社會增加率的改變？
 (A) 平均壽命增加
 (B) 民眾生活環境改善
 (C) 出生人數高於死亡人數
 (D) 人口移動增加
57. 要求學生記錄自己的運動行為，並自己決定獎懲標準，是運用哪一種行為改變之技巧？
 (A) 自我效能
 (B) 社會支持
 (C) 自我控制
 (D) 回饋反應
58. 有關兒童對疾病概念的敘述，下列何者正確？
 (A) 2-4歲兒童會認定與生病時間相近，但與疾病不相關的外在現象，為其生病的原因
 (B) 4-6歲的兒童認為不接觸生病的人就可以預防疾病
 (C) 7-9歲兒童認為生病是因為器官功能不良或不具功能
 (D) 10-12歲的兒童了解心理反應和態度會影響健康與疾病
59. 社區衛生護理師到方太太家做訪視，他發現方太太的新生兒有毛髮顏色變淡，且孩子身上有一股味道，這時社區衛生護理人員應懷疑這新生兒可能患有下列哪項疾病？
 (A) G-6-PD 缺乏症
 (B) 先天性甲狀腺低功能症
 (C) 苯酮尿症
 (D) 半乳糖血症
60. 社區衛生護理的特質，不包括：
 (A) 能觀察到個案與家庭的互動
 (B) 在個案照顧上，有較高的自主性
 (C) 需要家人共同參與照顧活動
 (D) 能提供較多元的醫療活動
61. 健康家庭的特徵，不包括：
 (A) 與社區保持聯繫
 (B) 成員的角色有彈性
 (C) 家庭成員沒有疾病的發生
 (D) 能積極的面對，及解決問題與爭議
62. 卡加利家庭評估模式(Calgary Family Assessment Model)的評估架構中不包括下列何者？
 (A) 家庭的功能
 (B) 家庭的發展
 (C) 家庭的結構
 (D) 家庭的優勢
63. 小凱目前就讀國小一年級，在生長曲線圖中，他的身高在25百分位，體重在70百分位，這顯示了他：
 (A) 身高與體重皆正常
 (B) 身高較高，體重過輕
 (C) 身高較矮，體重過重
 (D) 身高與體重皆較平均為低
64. 王同學11歲，雙腿均被熱水燙傷，以九法則計算燙傷範圍為：
 (A) 18%
 (B) 24%
 (C) 30%
 (D) 36%
65. 有關「檢疫」的敘述，下列何者正確？①防止傳染病的傳入 ②檢疫對象以接觸傳染病的人為主，不包含其他食物 ③檢疫時間長短要依據該傳染病最長潛伏期 ④增強宿主的抵抗力
 (A) ①②
 (B) ①③
 (C) ②③
 (D) ②④
66. 奇奇小學二年級在升旗時，發生抽搐及癲癇發作，此時護理人員應優先採取下列何種護理措施？
 (A) 打電話叫救護車
 (B) 將他抱回保健室，保持頭部垂下
 (C) 保護其頭部安全，維持側躺
 (D) 將硬物放入學童口中，以免咬到牙齒
67. 手足徐動型(athetoid type)腦性麻痺的病童，其主要的護理重點是：
 (A) 給予容易吞嚥的食物
 (B) 維持呼吸道通暢量
 (C) 增強下肢肌肉的收縮力
 (D) 防止壓瘡的產生

68. 有關 G-6-PD 缺乏症的症狀及臨床表徵之敘述，下列何者正確？
(A) 餵食困難、容易嘔吐
(B) 在進食後會出現症狀
(C) 會引起腸胃不適症狀
(D) 解暗紅色或茶色尿液
69. 有關新生兒黃疸問題及照護的敘述，下列何者最適當？
(A) 生理性黃疸約於出生後 7~10 天恢復正常
(B) 出現病理性黃疸時，應減少水分攝取
(C) 病理性黃疸最適宜的處置方式是換血
(D) 發生黃疸時，應立即停止哺餵母乳
70. 有關兒童罹患單純性疱疹的照護，下列措施之敘述何者最適當？
(A) 需採呼吸道隔離措施
(B) 病童須戴外科口罩，不能上學
(C) 體溫、疼痛控制為主要症狀處理
(D) 服用 Acyclovir 之目的為根治此病毒
71. 感染後人類免疫缺乏病毒的兒童，不可以接種下列何種疫苗？
(A) 麻疹免疫球蛋白
(B) 口服沙賓疫苗
(C) 流行性感感冒疫苗
(D) B 型肝炎疫苗
72. 有關水痘的疹子特性，下列何者不正確？
(A) 24 小時內發疹
(B) 最先出現於臉部
(C) 非常癢、變化快速
(D) 疹子愈多，體溫愈高
73. 兒童罹患腮腺炎之臨床徵狀，下列何者不正確？
(A) 無菌性腦膜炎為常見合併症
(B) 牙齦發炎導致咀嚼困難
(C) 發燒持續一週、頭痛、嘔吐
(D) 會抱怨耳朵痛、吞嚥困難
74. 有關德國麻疹之敘述，下列何者不正確？
(A) 好發於學齡晚期兒童及青少年
(B) 經由飛沫或接觸傳染，亦可經胎盤傳染
(C) 常見的合併症有中耳炎、腦膜炎、支氣管炎
(D) 疹子出現在淋巴腺腫大之後，約三天消退
75. 下列何種傳染性疾病易引發肺炎合併症？
(A) 破傷風
(B) 腮腺炎
(C) 玫瑰疹
(D) 麻疹
76. 有關腸病毒臨床表徵與照護之敘述，下列何者不正確？
(A) 罹病年紀愈小，症狀愈明顯
(B) 感染腸病毒的母親最好不要親餵母乳
(C) 疱疹性咽峽炎，突發性的高燒、喉嚨痛
(D) 疹子頂端有小水疱，分布於腹股溝等皺摺處
77. 有關血友病病童的照護，下列措施何者不恰當？
(A) 為一生存在的疾病，應小心看護
(B) 建議定期看牙醫，預防蛀齒的發生
(C) 關節內出血時，應立即注射所缺乏之凝血因子
(D) 出血造成腫脹疼痛時，最佳的止痛藥為 Aspirin
78. 有關巨結腸症之描述，下列何者不正確？
(A) 為腸道肌肉內層缺乏副交感神經節細胞
(B) 為先天性疾病，病變部位缺乏蠕動功能
(C) 病變下方的腸道內容物積聚、腸道脹氣
(D) 有慢性便秘、進食困難，嘔吐物含膽汁
79. 有關闌尾炎之描述，下列何者不正確？
(A) 常發生在學齡兒童、青少年期
(B) 典型症狀是下腹部疼痛及發燒
(C) 反彈性疼痛是可信的診斷依據
(D) 實驗室檢查可見白血球數很高
80. 小娃，1 歲大，因突發性的尖叫、哭泣且有嘔吐情形，之後解出草莓果醬樣大便，醫師懷疑為腸套疊，醫囑使用鉀劑灌腸。有關鉀劑灌腸之目的與照護措施，下列何者不恰當？
(A) 可做為診斷檢查及治療之用
(B) 若小娃出現高燒，應停止鉀劑灌腸
(C) 若無法使腸道還原成功，須馬上施行外科手術
(D) 灌腸結束後，若解出白色糞便表示腸道已恢復
81. 有關雷氏症候群出現的症狀，下列何者不正確？
(A) 腦水腫
(B) 腦壓升高
(C) 脂肪變性
(D) 頸部僵硬
82. 婷婷，12 歲，最近剛診斷患有全身性紅斑性狼瘡 (Systemic Lupus Erythematosus)，有關其照護之敘述，下列何者不恰當？
(A) 洗澡時，鼓勵使用冷水、鹼性肥皂及按摩
(B) 最好避免陽光直曬，隨身攜帶遮陽用具
(C) 告知類固醇停用後，副作用會逐漸消失
(D) 教導觀察尿量、體重改變等腎功能變化
83. 有關第 1 型糖尿病的敘述，下列何者不正確？
(A) 自體免疫反應，使產生胰島素的 β 細胞遭破壞
(B) 病童通常有體重過重、活力正常情形
(C) 頸部周圍皮膚變黑 (黑色棘皮病)
(D) 出現典型的多吃、多喝及多尿症狀
84. 有關糖尿病酮症酸中毒 (diabetic ketoacidosis, DKA) 之敘述，下列何者不正確？
(A) 為最常見的糖尿病急症
(B) 可能先於糖尿病的出現而發生
(C) 須立即給以葡萄糖水，糾正血糖狀態
(D) 儘快補液以恢復血容量，糾正失水狀態
85. 校園中發生火災事件，此時的處理措施下列何者不恰當？
(A) 阻止受傷的學童奔跑，以免火焰助燃
(B) 立即施予局部冰敷，減輕發炎程度
(C) 化學燒傷須以大量清水沖洗 30 分鐘
(D) 電灼傷情況，應先將電源切斷再急救
86. 在藥品優良臨床試驗準則第五條的規範中，當受試者為無行為能力者，其同意書應由誰簽屬？
(A) 有同意權之人
(B) 有監護權的人
(C) 法定代理人
(D) 一親等的人
87. 毒品已漸入侵校園，疑似長期使用安非他命的學生，其可能產生的副作用不包含下列何者？
(A) 自卑、自殺意念
(B) 頭痛、肌肉震顫
(C) 強迫性反覆動作
(D) 血壓上升、心悸

88. 有關自殺意念個案的照護描述，下列何者不恰當？
(A) 愈是常講要自殺的人，愈是要採不回應的方式
(B) 採取傾聽個案感受的方式比起使用勸說更重要
(C) 重憂鬱症患者常有自殺的傾向，應加強預防之
(D) 介紹同樣有自殺意念的個案討論是建議的方式
89. 校園管理措施內容包括安排良好的作息時間，讓學校充分發揮生活教育的功能，這是屬於學校衛生健康環境中的哪一種環境？
(A) 物理環境
(B) 事的環境
(C) 人的環境
(D) 自然環境
90. 為國小一年級學童進行卡介苗普查的首要目的為何？
(A) 早期發現結核病感染者，早期治療
(B) 檢查是否曾接受卡介苗接種紀錄
(C) 作為是否需進行胸部 X 光檢查依據
(D) 作為是否可讓學童繼續上學之依據
91. 母乳是最好的，有關母乳與配方奶的敘述，下列何者正確？
(A) 母乳脂肪的利用及吸收率高過配方奶
(B) 母乳含鐵量低但利用率高過配方奶
(C) 母乳所含蛋白質較不易引起過敏
(D) 母乳含較多的蔗糖，容易分解吸收
92. 有關產後母乳分泌機轉之敘述，下列何者不是促進機轉發生或持續的因素？
(A) 動情激素停止分泌
(B) 泌乳激素開始分泌
(C) 黃體激素開始分泌
(D) 新生兒的吸吮動作
93. 有關情緒障礙兒童的照護敘述，下列何項不適當？
(A) 其身體功能與生理之發展非評估重點
(B) 需評估個案家庭的互動型態及家族史
(C) 運用繪畫及遊戲協助兒童抒發情緒
(D) 照護模式的原則與情緒障礙成人不同
94. 小琦，2 歲，因手術前禁食而大哭，直吵著要「ㄗㄟ ㄗㄟ」，媽媽告訴他，不可以吃，因為要開刀，小琦仍是搖頭大哭，要喝牛奶。他的行為是下列何種認知思考特性的反應？
(A) 可逆性
(B) 自我中心
(C) 去集中作用
(D) 保留概念
95. 有關鈉離子對人體作用的敘述，下列何者不恰當？
(A) 維持血液滲透壓的主要無機鹽
(B) 主要存在於細胞外體液中
(C) 正常範圍值 3.5-5.3 mEq/L
(D) 尿崩症的患者會造成高血鈉
96. 為各年齡層兒童進行身體檢查與評估，下列敘述何者錯誤？
(A) 檢查嬰兒生命徵象的順序是呼吸、脈搏、血壓或體溫
(B) 學齡期兒童接受檢查前應先給予解釋讓其有操控的機會
(C) 學齡前期兒童非常害怕身體受到傷害，應避免量肛溫
(D) 幼兒期發展自主感，檢查前應讓他選擇檢查之順序

97. 依據 Piaget 認知發展理論，有關「運思前期」的發展特色，下列敘述何者不恰當？
(A) 為介於 2~7 歲的兒童
(B) 逆向思考的能力差
(C) 具有體積守恆概念
(D) 以自我為中心觀來推測周遭事物
98. 有關佛洛伊德(Freud) 性心理發展理論之敘述，下列何者正確？
(A) 出生到一歲為口腔期
(B) 3-6 歲階段為潛伏期
(C) 大小便訓練宜在口腔期
(D) 性蕾期是在認識自我身體
99. 小華，9 歲，在校園遊樂設施玩耍時造成 10 公分割傷，深度頗深，緊急止血後送至醫院急診處理，恐有破傷風感染之慮，有關破傷風處置之敘述，下列何者不恰當？
(A) 須盡早靜脈注射破傷風毒素
(B) 傷口需進行消毒或擴創術處置
(C) 需接受抗生素 Penicillin 注射
(D) 教導觀察臉部肌肉有無僵硬收縮
100. 小玲 6 歲，因上呼吸道感染引發扁桃腺炎，導致呼吸困難無法吞嚥，而行扁桃腺切除術，下列術後護理措施何者正確？
(A) 鼓勵深呼吸及用力咳嗽，以利排痰
(B) 密切監測生命徵象及觀察吞嚥次數有無增加
(C) 鼓勵採仰臥的姿勢，以利觀察嘔吐的狀況
(D) 給予西瓜汁、番茄汁等飲料以補充水分。

※ 本試卷共 100 題、計 6 頁
😊😊😊😊😊敬祝金榜題名😊😊😊😊😊