

注意事項：1. 本試卷共 100 題、計 6 頁，請仔細檢查並注意題號、頁數，確認後開始作答。
2. 一律於答案卡上作答，如未依規定塗寫不予計分。
3. 配分方式：每題 1 分，答錯不倒扣，共 100 分。

- 1、有關嬰兒生理發展的成長原則，下列何者錯誤？
 - (A) 由近到遠的動作發展
 - (B) 由簡單到複雜細膩的活動
 - (C) 從四肢尾端到頭的發展
 - (D) 由精細動作至整合動作的發展
- 2、根據皮亞傑(Piaget)的認知發展理論，18 個月的翔翔，應已具有下列哪一項概念？
 - (A) 時間概念
 - (B) 物體恆存概念
 - (C) 質量保留概念
 - (D) 萬物有靈觀的概念
- 3、下列有關母乳與嬰兒奶粉的比較，何者正確？
 - (A) 母乳乳清蛋白成分多
 - (B) 母乳鐵鈣濃度較低
 - (C) 嬰兒奶粉鈣磷比例相當
 - (D) 嬰兒奶粉飽和脂肪酸比例較多
- 4、林女士，86 歲，因失智退化，久臥病床，右臀部有 3x3 公分的凹陷狀傷口，深及肌肉組織（但未穿透），有組織液滲出。就其壓瘡程度，護理師首要的傷口處理方式為何？
 - (A) 給予局部按摩
 - (B) 使用膜性敷料覆蓋
 - (C) 用外科擴創術清除壞死組織
 - (D) 保持傷口乾燥，不可加以覆蓋
- 5、小波，9 歲，罹患氣喘，於家中自行使用尖峰呼氣流量計監測肺部氣流阻塞程度，今日重複執行 3 次的結果為 270L/min, 285L/min, 275L/min。應記錄哪個數值？
 - (A) 採最低值，270L/min
 - (B) 採中位數，275L/min
 - (C) 取平均值，277L/min
 - (D) 採最高值，285L/min
- 6、有關雷氏症候群(Reye's syndrome)病童的臨床症狀，下列敘述何者正確？
 - (A) 染色體異常造成程度不等的外觀畸形
 - (B) 急性腦病變伴隨肝臟脂肪變性
 - (C) 尿素排出減少，血清中的氨濃度因而降低
 - (D) 血液黏稠度增加易形成血栓
- 7、小佩，7 歲，診斷為急性腎絲球腎炎(Acute glomerulonephritis)，下列何項護理措施不適當？
 - (A) 少尿時，多給予含鉀高的食物，如香蕉、橘子、葡萄等
 - (B) 須臥床休息至目視無血尿、水腫退、血壓正常為止
 - (C) 當限水或使用利尿劑時，須每天定時測量體重
 - (D) 有水腫及高血壓時，須限制水分與鈉的攝取
- 8、小亮，4 歲被診斷為腎病症候群(Nephrotic syndrome)。有關小亮的檢查，下列何者不是腎病症候群的診斷依據？
 - (A) 血尿
 - (B) 蛋白尿
 - (C) 高膽固醇血症
 - (D) 低白蛋白血症
- 9、有關腸病毒的敘述，下列何者錯誤？
 - (A) 傳染高峰期在夏、秋二季
 - (B) 散播途徑主要是口沫及接觸傳染
 - (C) 在 50°C 以上的溫度，會很快的失去活性及死亡
 - (D) 併發症之一的手足口病，主要侵犯 5 歲以上的孩童
- 10、小潔，18 個月大，體重為 10 公斤，正在接受限水試驗，來診斷是否有尿崩症。當病童出現下列何者徵象時，要暫停此試驗？
 - (A) 體重 9.4 kg
 - (B) 體重 9.8 kg
 - (C) 尿量 5 c.c./kg/hr
 - (D) 尿量 8 c.c./kg/hr
- 11、張先生，56 歲，接受腰椎板切除術。有關術後之護理措施，下列何者錯誤？
 - (A) 於膝下墊一小枕頭
 - (B) 手術後採圓滾木翻身法
 - (C) 下床後再穿上支架(brace)，以減緩不適
 - (D) 協助執行上下肢體關節的全範圍關節運動
- 12、有關心臟病產婦的護理指導，下列何者不適當？
 - (A) 衛教產婦以子宮內避孕器避孕，不宜服用口服避孕藥
 - (B) 鼓勵產婦產後採半坐臥式休息
 - (C) 心臟功能為第一級的產婦仍可以哺餵母乳
 - (D) 預防便秘發生
- 13、護理師在衛教先天性心臟病童的父母親，有關居家照護注意事項時，下列何者不適當？
 - (A) 採少量多餐方式進食
 - (B) 確定攝取足夠的鉀離子
 - (C) 在各種呼吸道感染流行期間，避免進出公共場所
 - (D) 給予 digoxin 之後必須測量心跳，以防藥物過量中毒
- 14、小智，10 歲，因白血病住院接受化學治療已一週，絕對嗜中性白血球計數(ANC)為 26，請問下列護理措施何者最適當？
 - (A) 鼓勵多吃生菜沙拉避免便秘
 - (B) 限制親友及同學探訪，避免感染
 - (C) 告知若無口腔潰瘍即可停用 Nystatin
 - (D) 保持口腔清潔，每日以硬毛牙刷刷牙
- 15、將新生兒放在冷的磅秤上造成體熱喪失，是屬於下列何種散熱途徑？
 - (A) 對流
 - (B) 傳導
 - (C) 輻射
 - (D) 蒸發

- 16、蔣女士，76 歲，因末期腎病須接受血液透析，醫師建議施予動靜脈瘻管術，有關動靜脈瘻管術後之護理原則，下列何者錯誤？
- (A) 將瘻管肢體抬高
 - (B) 術後鼓勵患者做握球運動
 - (C) 勿在瘻管肢體測量血壓及抽血
 - (D) 手術後瘻管肢體避免提重物，但可以戴手錶
- 17、小威，5 個月大，出生正常且定期於健康服務中心完成嬰幼兒預防接種。現因川崎氏症(Kawasaki disease)第一次住院接受症狀處理，及靜脈注射免疫球蛋白治療，下列護理措施何者錯誤？
- (A) 以少量多餐方式補充流質或軟質食物，並監測輸出入量，以注意是否脫水現象
 - (B) 急性期給予 aspirin 100 mg/kg/day 以抑制發炎及血小板凝集而造成心臟血管損傷
 - (C) 注意小威四肢末梢循環狀態及紅疹、水腫及脫皮，給予棉質透氣之衣物
 - (D) 提醒母親帶小威完成常規的疫苗接種，以增強免疫力
- 18、李女士，36 歲，將接受靜脈注射腎盂攝影術(intravenous pyelography; IVP)，下列護理處置何者錯誤？
- (A) 需評估個案對碘的過敏史
 - (B) 檢查前可給予瀉劑或灌腸
 - (C) 檢查後不可飲水，以免造成腎功能損傷
 - (D) 檢查後應監測腎功能的改變，如：肌酸酐
- 19、有關剖腹產後的護理處置，下列敘述何者錯誤？
- (A) 產後 24 小時內，密切監測生命徵象變化
 - (B) 隨時評估疼痛狀況，適時給予止痛劑緩解疼痛
 - (C) 第一次下床應教導產婦使用束腹帶，以減低傷口之疼痛
 - (D) 接受腰椎硬膜外麻醉的產婦需協助平躺 6~8 小時，以預防脊髓性頭痛
- 20、胡先生，65 歲，因很難控制高血壓而入院，兩個禮拜來一直有盜汗、心悸與焦慮。腹部 CT Scan 檢查，診斷為嗜鉻細胞瘤(pheochromocytoma)。護理師在照顧胡先生時，應注意評估下列何種情況？
- (A) 高血糖
 - (B) 低血鈣
 - (C) 高血鉀
 - (D) 低血鈉
- 21、江太太，妊娠 30 週，住院安胎中，護理師依醫囑給予 Decadron 8mg 肌肉注射，此目的為何？
- (A) 降低血壓
 - (B) 減少子宮收縮
 - (C) 降低早產兒有感染的危險
 - (D) 降低早產兒發生呼吸窘迫症候群
- 22、有關玫瑰疹的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 會有突發性高燒
 - (B) 疹子首先出現在臉部
 - (C) 熱性痙攣是常見的合併症
 - (D) 感染者日後仍有可能再得
- 23、陳女士，懷孕 31 週，突然發生腹痛合併陰道出血，最可能是下列哪一種情況？
- (A) 前置胎盤
 - (B) 先兆性流產
 - (C) 胎盤早期剝離
 - (D) 妊娠誘發性高血壓
- 24、有關「健康促進」在流行病學的三級預防措施，下列敘述何項正確？
- (A) 目的是在於去除病因
 - (B) 屬於疾病易感期的預防工作
 - (C) 所採取的預防工作應是篩檢或調查
 - (D) 屬於早期診斷早期治療的預防工作
- 25、感染麻疹的兒童會出現 3C 症狀，不包括下列何者？
- (A) 鼻炎(coryza)
 - (B) 咳嗽 (cough)
 - (C) 痙攣 (convulsion)
 - (D) 結膜炎(conjunctivitis)
- 26、有關血栓性靜脈炎，下列護理原則何者錯誤？
- (A) 病人足背屈曲時，腓腸肌會產生疼痛
 - (B) 口服 Coumadin 可預防及治療靜脈血栓
 - (C) 協助病人抬高患肢，可減輕炎症及疼痛
 - (D) 應定期按摩病人患肢，以促進靜脈循環
- 27、懷孕初期補充葉酸，下列何者為最好的食物來源？
- (A) 新鮮葉菜類
 - (B) 豬肉
 - (C) 馬鈴薯
 - (D) 海鮮
- 28、有關嬰兒猝死症候群，下列敘述何者正確？
- (A) 女嬰發生率較高
 - (B) 春夏季發生率較高
 - (C) 最常發生在出生 2 至 4 個月的嬰兒
 - (D) 出生體重過重者發生率較高
- 29、有關脊柱側彎，下列敘述何者錯誤？
- (A) X 光檢查可確立診斷
 - (B) 早期可以游泳來治療
 - (C) 彎腰時，背部呈現明顯的突峰
 - (D) 結構性脊柱側彎是由姿勢習慣不良所造成的
- 30、有關安非他命之中毒症狀，下列何者錯誤？
- (A) 焦躁
 - (B) 心跳加速
 - (C) 體溫降低
 - (D) 瞳孔放大
- 31、有關急性骨髓炎，下列護理指導何者錯誤？
- (A) 攝取均衡飲食
 - (B) 可抬高患肢，以減輕腫脹
 - (C) 加強患肢之活動，以減輕疼痛
 - (D) 按時服用抗生素，以維持療效
- 32、有關格雷氏症(Grave's disease)，下列敘述何者正確？
- (A) 好發於中老年女性
 - (B) 屬於遺傳性的自體免疫反應疾病
 - (C) 由甲狀腺荷爾蒙的分泌不足所引起
 - (D) 主要徵象為眼球突出、甲狀腺腫大和甲狀腺功能低下

- 33、小娟，3 歲，罹患川崎氏症(Kawasaki disease)，小娟在亞急性期已不再發燒，但醫囑仍給予低劑量的 Aspirin (5mg/kg/day)，其主要目的為：
- (A) 預防發燒
(B) 減輕關節的疼痛
(C) 改善軀幹皮膚疹的發癢
(D) 抗發炎及抑制血小板凝集
- 34、下列關於兒童事故傷害的防範措施，何者正確？
- (A) 對於剛學走路的嬰幼兒而言，鋪厚桌布可減少其因碰觸桌角而受傷
(B) 不會翻身的嬰兒，不需用床欄以避免其不安感
(C) 不允許兒童邊吃東西、邊跑、邊玩
(D) 對於正值口慾期的嬰幼兒，可將奶嘴懸掛其頸部以滿足其基本生理需求
- 35、急救方法中，哈姆立克法(Heimlich method)適用於下列何種情況？
- (A) 咽喉部異物完全阻塞
(B) 支氣管異物阻塞
(C) 氣管異物部分阻塞
(D) 鼻腔異物阻塞
- 36、近年兒童虐待案件逐漸增加，根據內政部兒童局統計，施虐者最大多數是兒童的：
- (A) 父母 (B) 親友
(C) 師長 (D) 祖父母
- 37、有關兒童汽車安全座椅的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 三個月以下的嬰兒，須在頸部兩側放置支撐物
(B) 體重未達 10 公斤的嬰兒，可坐在後座放置的安全座椅，面向車尾
(C) 體重 10~18 公斤的幼童，若車子前座有安全氣囊，則可以在前座放置安全座椅，面向車尾
(D) 體重 18~36 公斤的兒童，應坐在後座，並使用安全帶
- 38、有關兒童虐待的敘述，下列何者正確？
- (A) 以家庭為中心，進行全家性的會談
(B) 發現兒童被虐待的行為應於 48 小時內向主管機關報備
(C) 醫護人員需要依收集到的資料，確認施虐者
(D) 虐待兒童行為確立後，需提供保護措施，預防進一步傷害
- 39、寧寧，15 歲，因體重快速減輕而入院，經醫師診斷為神經性厭食症。護理師為寧寧擬訂護理計畫時，須優先處理下列哪一項護理處置？
- (A) 改善與家人的互動關係
(B) 教導其個人應對能力
(C) 心理諮商以矯正身體心像
(D) 改善嚴重的營養不良
- 40、根據艾瑞克森 (Erickson) 的心理社會發展理論，青少年時期的發展任務為：
- (A) 信任感 (B) 認同感
(C) 進取性 (D) 親密感
- 41、著重於「宿主」與「環境」間的關係，而不強調致病原的是哪些致病模式？
- (A) 三角模式、輪狀模式
(B) 輪狀模式、網狀模式
(C) 網狀模式、階梯模式
(D) 階梯模式、三角模式
- 42、學校健康教學的主要目的為何？
- (A) 預防傳染病的發生
(B) 缺點發現與矯治
(C) 意外事故緊急處理
(D) 養成健康生活習慣
- 43、下列哪一項學校衛生護理工作是屬於第一段第二級預防工作？
- (A) 指導經期衛生
(B) 參與牙齒塗氟計畫
(C) 進行視力篩檢
(D) 體重過重學童的健康管理
- 44、教導幼兒園小朋友正確洗手的方法，下列哪一項是最合適的教學法？
- (A) 提供圖片展覽法
(B) 提供小班級演講法
(C) 提供示範與演練法
(D) 播放網路上關於正確洗手的影片
- 45、根據「國小新生入學後預防接種紀錄檢查與補種指引」，學校護理師對從未接種過麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR) 的國小一年級新生的處置，下列何者正確？
- (A) 補接種 1 劑
(B) 補接種 2 劑
(C) 有可能已自然感染，無須補接種
(D) 先安排血中抗體檢查，視抗體情況諮詢醫師決定
- 46、白先生，70 歲，最近因上呼吸道感染，呼吸喘入院，動脈血氧分析為 pH7.25，PaCO₂ 55mmHg，PaO₂ 85mmHg，HCO₃⁻ 26mEq/L，白先生此時狀況為何？
- (A) 部分代償性呼吸性酸中毒
(B) 完全代償性呼吸性酸中毒
(C) 部分代償性代謝性酸中毒
(D) 完全代償性代謝性酸中毒
- 47、關於理想的學校環境，下列哪一項正確？
- (A) 飲水之餘氯量應為 0.2~1.5ppm 之間
(B) 教室窗戶的面積應占教室建坪的 1/3
(C) 椅面高度為身高的 1/4
(D) 教室內噪音應低於 90 分貝
- 48、一氧化碳與血紅素的親和力大約是氧的幾倍？
- (A) 1/2 倍
(B) 2~5 倍
(C) 20~50 倍
(D) 200~250 倍

- 49、下列何者不是交感神經的起源？
 (A) 第一胸脊髓
 (B) 第一腰脊髓
 (C) 第二薦脊髓
 (D) 第二腰脊髓
- 50、最適合且常用的骨髓檢體抽取處是：
 (A) 髂嵴 (B) 恥骨弓
 (C) 坐骨棘 (D) 恥骨肌線
- 51、關於血球功能的敘述，下列哪一項不正確？
 (A) 紅血球能運送氧氣
 (B) 淋巴球能製造抗體
 (C) 嗜中性球及單核球能吞噬入侵的微生物
 (D) 嗜酸性球會釋放組織胺引發過敏反應
- 52、下列關於健康學校環境的描述，下列哪一項正確？
 (A) 提供開放性環境進行諮商，以減少學生的壓迫感
 (B) 福利社應供應種類多樣化的點心及零食
 (C) 安全計畫需包括緊急照護和適當輸送師生的管道
 (D) 課桌椅應現代化及美觀以提高學習興趣
- 53、若學生檢查結果發現有蟯蟲，學校護理師需進行哪些處置？
 ①於 24 小時內報告當地衛生機構②針對陽性學生及其家人給予驅蟲藥治療③聯絡衛生單位，安排全校學生的治療與預防措施④加強衛生教育，尤其須確實執行飯前洗手⑤予以保護隔離，並針對排泄物進行隔離
 (A) ①⑤ (B) ②④
 (C) ③④ (D) ②⑤
- 54、莉莉，14 歲，身高 152 公分，體重 48 公斤，向學校護理師表示很在意自己的身材。請問莉莉的 BMI (body mass index) 值是多少？
 (A) 20.8 (B) 17.8
 (C) 14.8 (D) 23.8
- 55、護理師發現學生疑似遭到家暴，最適合採取下列哪一種行動？
 (A) 建議學生立即撥打 113 婦幼專線
 (B) 通知校長及通報主管機關
 (C) 請學生的好朋友幫忙
 (D) 勸告父母不應體罰孩子
- 56、小偉，14 歲，疑似腦膜炎，並且出現咳嗽、顱內壓升高的症狀。關於照護措施的敘述，下列哪一項是正確的？
 (A) 維持屈膝仰臥，以利靜脈血回流
 (B) 給予背部叩擊，以促進痰液排出
 (C) 教導深呼吸咳嗽，避免引發肺炎
 (D) 攝取高纖維食物，以避免便秘
- 57、下列何者最常被用成教室內空氣品質良好與否的指標？
 (A) NO (一氧化氮)
 (B) CO (一氧化碳)
 (C) CO₂ (二氧化碳)
 (D) SO₂ (二氧化硫)
- 58、有關再生不良性貧血病童的臨床症狀與實驗室檢查，下列敘述哪一項錯誤？
 (A) 胎兒紅血球降低時，易出現進行性的溶血性貧血
 (B) 嗜中性白血球數少於 1,500/mm³ 時，會容易發生細菌感染現象
 (C) 血小板數小於 50,000/mm³ 時，易出現瘀斑及出血現象
 (D) 血容積小於 30%時，會有心跳加快、呼吸急促的現象
- 59、關於癌症病童疼痛時給予止痛劑的原則，下列哪一項敘述錯誤？
 (A) 給藥途徑以口服優先選用
 (B) 不可併用不同類的止痛劑
 (C) 定時給予止痛劑，以維持無痛狀態
 (D) 重度疼痛需選擇嗎啡類的止痛劑
- 60、趙先生，66 歲，罹患肺癌，出現頸部、臉部及上肢腫大，併發呼吸困難，其可能出現下列何種狀況？
 (A) 霍納氏症候群
 (B) 庫欣氏症候群
 (C) 上腔靜脈症候群
 (D) ADH 分泌不當症候群
- 61、關於法洛氏四重畸形病童最常見的臨床表徵是發紺，下列哪一項敘述錯誤？
 (A) 主要是肺動脈狹窄所致
 (B) 是血液中含氧量過低的結果
 (C) 主要是血液有由左至右的分流
 (D) 急性缺氧發作常發生在早晨、餵奶、哭泣或排便時
- 62、小虎腳踝受傷並出現局部腫脹及疼痛之主訴；經醫師診斷為韌帶裂傷，須繃帶包紮並制動兩週。關於小虎腳踝的包紮法，下列哪一項正確？
 (A) 以套入式彈性網狀繃帶包紮患部
 (B) 以紗布繃帶採螺旋形包紮患部
 (C) 以三角巾採人字形包紮患部
 (D) 以彈性繃帶採 8 字形包紮患部
- 63、剛出生的新生兒婷婷被診斷為葡萄糖—6—磷酸鹽去氫酶缺乏症 (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency, G-6-PD Deficiency)，下列關於此代謝疾病之敘述，哪一項錯誤？
 (A) 嬰兒發燒時應避免使用 Aspirin
 (B) 此疾病主要由父親傳給小孩，以女嬰居多
 (C) 母親哺乳期間應避免食用蠶豆
 (D) 易發生溶血性貧血及高膽紅素血症
- 64、關於脈搏短絀 (pulse deficit) 的脈律特性，下列哪一個正確？
 (A) 脈搏快到無法測量且不規則
 (B) 脈搏間隔時間長短不一，跳幾下停一下
 (C) 心尖脈與橈動脈的跳動不一致
 (D) 有時脈動明顯，有時無法摸到

- 65、王小姐，22 歲，與朋友聚餐後回家，半夜出現腹瀉及嘔吐多次，此時王小姐可能會出現何種狀況？
 (A) 高血鉀 (B) 低血鈉
 (C) 高血鎂 (D) 低血鈣
- 66、下列何者不是術後病人呼吸道分泌物增加的原因？
 (A) 脫水 (B) 吸菸史 10 年以上
 (C) 上呼吸道感染 (D) 插入氣管內管
- 67、下列抗腫瘤藥物，何種會出現心臟毒性？
 (A) Cisplatin (B) 5-FU
 (C) Fosfamide (D) Doxorubicin
- 68、有關兒童永久齒的敘述，下列何者正確？
 (A) 約 4 歲開始長出第 1 顆第一白齒
 (B) 約 6 歲開始長出第 1 顆第一白齒
 (C) 約 4 歲開始長出第 1 顆上門牙
 (D) 約 6 歲開始長出第 1 顆上門牙
- 69、下列有關肺結核疾病之敘述，何者錯誤？
 (A) 結核桿菌是革蘭氏陽性嗜酸性桿菌
 (B) 傳染途徑是經由飛沫傳染
 (C) 常合併肋膜積水及其它器官的侵犯
 (D) 咳血是最初出現的症狀
- 70、肝衰竭患者形成腹水的基本機轉，下列敘述何者錯誤？
 (A) 因白蛋白過少導致血漿膠質滲透壓增加
 (B) 因留鹽激素的作用亢進導致鈉及水分滯留增多
 (C) 因門脈高壓導致淋巴液的製造增加
 (D) 因門脈高壓導致血漿的液體靜力壓增加
- 71、學生於校園意外受傷出血至健康中心止血包紮處理，下列生理指標，何者較不可能出現？
 (A) 無尿 (B) 舒張壓上升
 (C) 心跳速率增加 (D) 呼吸速率增加
- 72、依世界衛生組織建議，中度疼痛之藥物處理原則為何？
 (A) 非嗎啡類止痛劑＋輔助藥
 (B) 弱嗎啡類止痛劑
 (C) 強嗎啡類止痛劑
 (D) 神經阻斷術
- 73、下列腫瘤標記，何者是監測前列腺癌治療效果？
 (A) A-Fetoprotein (B) CA125
 (C) PSA (D) CK19
- 74、張先生，50 歲，有家族高血壓病史，某日感到胸部有壓迫感、疼痛、眩暈、呼吸不順就醫治療。針對張先生之症狀，醫囑給予硝酸甘油酯製劑，緩解心絞痛，有關藥物處置措施何者錯誤？
 (A) 硝酸甘油酯舌下含片連續服用三片後仍未改善症狀，應立即緊急就醫
 (B) 使用硝酸甘油酯貼片時，每日更換貼片時最好貼同一位置可使濃度增加
 (C) 使用硝酸甘油酯皮膚貼劑約 1-2 小時即可穩定維持血中濃度
 (D) 含服硝酸甘油酯時，舌尖會出現熱辣感是正常反應
- 75、憂鬱症患者常用的自衛機轉為何？
 (A) 內射 (B) 投射
 (C) 反射 (D) 轉移
- 76、下列有關物質濫用之敘述，何者不正確？
 (A) 酒精的物質濫用具有家族傾向
 (B) 心理和精神協會皆認定物質濫用是屬於一種疾病
 (C) 物質濫用與社會環境較無關聯
 (D) 物質濫用是認知與行為障礙
- 77、依據皮亞傑(Piaget)認知發展理論，7 歲兒童尚未具備的概念，包括下列幾項？
 ①質量②面積③長度④重量⑤數目⑥體積
 (A) ①②
 (B) ③④
 (C) ④⑥
 (D) ⑤⑥
- 78、依據皮亞傑(Piaget)認知發展理論，有關 4 歲兒童的溝通互動，下列敘述何者錯誤？
 (A) 已具有邏輯性思考，可以言語充分溝通
 (B) 處於運思前期，難具體說出身體不適的原因
 (C) 因較自我為中心，可用畫圖方式表達想法
 (D) 溝通重點著重於「現在及這裡」
- 79、肺癌之類型中，何者與吸菸較無關，常見於女性，且化學治療反應較差？
 (A) 鱗狀細胞癌 (B) 大細胞癌
 (C) 腺癌 (D) 小細胞癌
- 80、關於麻疹 (measles)的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 紅疹依序出現於耳後、髮際、前額及上頸部、上肢、軀幹至下肢
 (B) 科氏斑點在發疹後第 2 天才逐漸減輕
 (C) 病童自出疹後 5 天內需採呼吸道隔離
 (D) 傳染期主要是在出疹期
- 81、有關日本腦炎的敘述，下列何者正確？
 (A) 經過飛沫或接觸體液而傳染
 (B) 注射日本腦炎疫苗可達成全面預防效果
 (C) 由三斑家蚊及環狀家蚊叮咬所傳染
 (D) 每年 3~5 月是傳染高峰期
- 82、下列哪兩種傳染性疾病會出現手腳脫皮現象？
 (A) 水痘與川崎氏症
 (B) 猩紅熱與風濕熱
 (C) 猩紅熱與川崎氏症
 (D) 風濕熱與麻疹
- 83、下列何者不是兒童細菌性腦膜炎(bacterial meningitis)的症狀？
 (A) 抽搐 (B) 嘔吐
 (C) 腹痛 (D) 發燒
- 84、急性淋巴性白血病兒童可以接種哪一類疫苗？
 (A) 流感疫苗
 (B) 德國麻疹疫苗
 (C) 水痘疫苗
 (D) 卡介苗

- 85、小珍，7歲，是一位胰島素依賴型糖尿病兒童，住院治療後返回學校就讀。當她在校園中出現盜汗、發冷、手腳顫抖，下列措施何者最優先採用？
(A) 給予皮下注射胰島素
(B) 給她吃單醣類食物，如果汁、方糖
(C) 讓她喝下溫開水保暖休息
(D) 肌肉注射升糖素(Glucagon)
- 86、為5歲罹患急性中耳炎兒童滴入耳藥的方法是？
(A) 將耳翼往下往後拉
(B) 將耳翼往上往後拉
(C) 將耳翼往上往前拉
(D) 將耳翼往下往前拉
- 87、李同學是田徑選手，在訓練過程感到身體不適，緊急送到急診室後，診斷為橫紋肌溶解症(rhabdomyolysis)，實驗室檢查顯示其血清鉀離子高達7.0mg/dL。下列緊急處置，不適用於李同學？
(A) 限水(fluid restriction)
(B) 予以靜脈注射 mannitol 以及鹼化尿液
(C) 予以靜脈注射 NaHCO₃
(D) 予以靜脈注射 calcium gluconate
- 88、有關中耳炎兒童的臨床表徵，下列敘述何者不正確？
(A) 會有咳嗽、哽噎、發紺等現象
(B) 長期反覆感染，會造成聽力喪失
(C) 會有搖頭躁動不安，不斷拉扯耳朵的動作
(D) 一旦鼓膜破裂，分泌物流出時，疼痛隨即改善
- 89、接種B型流行性感胃嗜血桿菌疫苗，最主要是在預防哪一種疾病？
(A) 肝炎 (B) 百日咳
(C) 腦膜炎 (D) 流行性感胃
- 90、有關罹患後天免疫缺乏症候群(acquired immune deficiency syndrome)兒童的照護敘述，下列何者正確？
(A) 建議兒童戴口罩避免飛沫傳染
(B) 兒童接觸過的東西都要消毒，避免接觸傳染
(C) 兒童不宜到游泳池游泳，避免傳染他人
(D) 處理兒童的切割傷或抓傷的傷口時才戴手套
- 91、當病童被診斷為雷氏症候群(Reye's Syndrome)時，護理人員需加強下列哪一方面的評估？
(A) 腎功能 (B) 消化功能
(C) 免疫功能 (D) 腦神經功能
- 92、陳小弟因右腿骨折住院手術後以石膏固定，有關出院護理指導，下列何者不適當？
(A) 右腿可能會影響在學校活動能力，應多臥床休息
(B) 若石膏內肢體搔癢，用扇子搨涼或輕輕拍打石膏
(C) 若弄濕石膏需自然風乾，不可使用吹風機加速乾燥
(D) 時常檢查患肢皮膚顏色、感覺或運動能力有無改變
- 93、有關護理人員協助罹患第一型糖尿病的學齡兒童自我照顧內容，下列敘述何者錯誤？
(A) 協助學童體認血糖過高或血糖過低時之身體反應
(B) 教導學童於血糖變化如何調整飲食與活動之方法
(C) 以圖片與實物教導學童胰島素注射之部位與方法
(D) 鼓勵學童將血糖控制良好後就不需胰島素注射
- 94、依照三段五級預防保健的觀念，學生之預防注射是屬於何項工作？
(A) 健康促進 (B) 早期診斷
(C) 特殊保護 (D) 疾病篩檢
- 95、學童的仰臥起坐，是哪種健康體適能？
(A) 柔軟度 (B) 心肺耐力
(C) 肌肉量與肌耐力 (D) 協調力及平衡性
- 96、學童午餐後使用牙膏需含氟濃度為多少？
(A) 300-500ppm (B) 600-800ppm
(C) 700-900ppm (D) 1000ppm 以上
- 97、預防食物中毒的衛教內容，下列何者不適當？
(A) 調理食品前後都需徹底洗淨，有傷口要先包紮
(B) 用不同器具處理生熟食，避免交叉污染
(C) 熱存溫度需高於超過50°C，細菌才容易被消滅
(D) 冷藏溫度需低於5°C才能抑制細菌生長
- 98、兒童癲癇發作時，下列哪項護理措施正確？
(A) 固定兒童四肢，避免抽搐時發生骨折
(B) 觀察並記錄發作的型態與時間
(C) 將緊閉的牙關打開，置壓舌板於口中
(D) 讓兒童保持平躺頭後仰，以維持呼吸道通暢
- 99、學齡兒童顱內壓增高之早期徵候，下列何者正確？
(A) 瞳孔放大
(B) 噴射狀嘔吐
(C) 去大腦皮質姿勢
(D) 雙眼出現落日眼徵象
- 100、一年級的小強，因罹患先天性心臟病，長期服用毛地黃。您需要協助衛教指導老師了解觀察可能的毛地黃中毒的典型症狀，下列何者不正確？
(A) 皮膚出現紅疹
(B) 頭痛、嗜睡
(C) 噁心、嘔吐
(D) 心跳徐緩或不規律

本試卷共 100 題，計 6 頁

☺☺☺☺☺ 敬祝金榜題名 ☺☺☺☺☺