

桃園縣 101 年度縣立各級學校護理人員暨營養師試務聯合甄選【護理人員】試題

注意事項：1.本試卷共 100 題、計 6 頁，請仔細檢查並注意題號、頁數，確認後開始作答。
2.一律於答案卡上作答，如未依規定塗寫不予計分。
3.配分方式：每題 1 分，答錯不倒扣，共 100 分。

- C 1. 校護針對學校環境所作的評估，下列何者合乎學校設備與環境的標準？
(A)教室內噪音以不超過 80 分貝為原則
(B)桌面的平均照度值應大於 700 米燭光
(C)學生身高為 140 公分，教室椅面高度應為 40 公分
(D)教室窗戶應佔教室建坪面積的三分之一，以利採光及通風
- D 2. 依據我國「毒品危害防制條例」分級，下列何者是屬於第一級毒品？
(A)紅中 (B)大麻 (C)安非他命 (D)嗎啡
- A 3. 下列何者不是健康促進學校增強「個人技能」的主要工作項目？
(A)體格缺點矯治 (B)經期保健課程
(C)潔牙教學 (D)急救訓練課程
- A 4. 某國中有 80 位老師參加三高篩檢活動，結果發現有 30 位篩檢結果異常，經醫師診斷後，結果有 18 位確定有高膽固醇問題，而其中有 5 位是第一次確診，請問該校之高膽固醇盛行率約為何？
(A)22.5% (B)16.0% (C)6.3% (D)4.4%
- B 5. 有關青少年吸菸之相關敘述，何者錯誤？
(A)青少年吸菸有增加的趨勢
(B)根據菸害防治法第二十四條之規定，高級中等以下學校全面禁菸
(C)根據菸害防治法之規定，未滿十八歲者，不得吸菸
(D)家長吸菸者，其子女在青少年時期開始吸菸的可能性較高
- A 6. 有關健康促進學校的敘述，下列何者錯誤？
(A)建立由上而下的推展模式，將健康融入日常生活之中
(B)較傳統學校衛生更重視社會環境的改善
(C)強調、鼓勵及培養教職員生願意主動參與校園健康管理
(D)是一個有益於生活、學習與工作的健康場所
- A 7. 有關腸病毒的敘述，下列何者正確？
(A)會合併出現高燒、意識不清、抽搐等症狀
(B)目前沒有任何一種腸病毒可以用疫苗來預防
(C)感染者之傳染力在發病前一週是最高的
(D)曾感染過腸病毒之手足口症的患者，以後不會再得到相同病症
- D 8. 預防腸病毒的發生，下列何者較正確？
(A)注射免疫球蛋白
(B)多喝牛奶，增強免疫力
(C)提升室內溫度，以達殺菌效果
(D)以漂白水擦拭或消毒室內環境
- C 9. 有關學校衛生工作範圍的敘述，下列何者不正確？
(A)提供學校良好的生活環境
(B)實施學童缺點矯治工作
(C)實施學童急性傳染病治療工作
(D)實施學童各類預防接種工作
- C 10. 一位有氣喘病史的兒童，於上課時突然發作，下列處置措施何項錯誤？
(A)請小明採半坐臥姿，並噘嘴呼吸
(B)搖高床頭，給予適當流量的氧氣，注意呼吸道通暢
(C)藥物使用後 20 分鐘，若喘鳴及呼吸困難仍不見改善，須立即送醫
(D)詳實記錄氣喘發作症狀、處理方式，並通知家長
- A 11. 校內發生食物中毒案件，校護處理流程下列何者錯誤？
(A)依專業先行驗傷，初步處理，病情嚴重者通知警察局 (110) 協助就醫
(B)校內成立應變小組指揮，導師分工，協助登錄並通知家長
(C)通報衛生局和教育局派員至校協助處理，視情況負責發佈新聞
(D)學校成立單一窗口及發言人，持續追蹤及統計傷病人數，並通報教育局後續狀況
- C 12. 健康檢查的結果發現某位一年級學生有蟇蟲，校護需執行下列那些工作？ ①於 24 小時內報告當地衛生機構
②對蟲卵檢查結果為陽性學生及其家人，應給予驅蟲藥治療
③向學校報告，並針對排泄物進行隔離
④加強衛生教育，尤其是飯前洗手
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- D 13. 有關兒童水痘傳染期的敘述，下列何者正確？
(A)出疹前 1 週、發疹期及痂皮乾燥後 2 週內，均具有傳染力
(B)出疹後 1-2 天到體溫恢復正常前，傳染力最高
(C)出疹前 2-3 週之潛伏期，傳染力最高
(D)出疹前 1-2 天到痘疹結痂後 5-7 天內，均具有傳染力
- D 14. 下列檢查結果何者顯示罹患第一型糖尿病兒童在過去三個月內血糖控制良好？
(A)尿中酮酸為陰性
(B)空腹血糖值為 100 mg/dL
(C)飯後 2 小時血漿葡萄糖濃度值為 130 mg/dL
(D)糖化血色素值為 6%
- C 15. 當胰島素注射過量時，可能會引發下列何種反應？
(A)出現深而快的呼吸 (B)呼吸有水果味
(C)手腳發抖，冒冷汗 (D)尿量增加及口渴
- B 16. 有關教育部體育司針對學童健康體位提倡之敘述，下列何者錯誤？
(A)每天二份奶，健康跟著來；天天五蔬果、減脂輕鬆走！
(B)每日應睡足 8 小時、避免熬夜且每天應運動 20 分鐘，養成每週 140 分鐘規律運動習慣。
(C)提出「健康吃、快樂動」的觀念，除了要均衡飲食外，更應藉由運動來提升新陳代謝。
(D)每日靜態休閒時間，如看電視、打電動、上網、用電腦時間，最好少於 2 小時



- A** 17. 顏小弟於上體育課時突然暈倒，由導師送至健康中心，**D** 校護對於健康檢查結果所發現的缺點，通知家長、協助轉診並追蹤，是屬於下列何種功能？
 (A)預防 (B)檢查 (C)轉介 (D)矯治
- B** 18. 某國中生由 3 樓跳下企圖自殺，下列急救處置中何者不適切？
 (A)呼救請求協助 (B)儘速將傷者移到平坦處
 (C)檢查意識反應 (D)通暢呼吸道
- B** 19. 某位學生午餐時邊吃邊與同學嬉戲，突然手緊抓喉部、無法說話、呼吸困難、表情痛苦且冒汗，下列緊急處置何者適當？
 (A)開始進行人工呼吸 (B)進行腹部推壓 5 次
 (C)開始進行心外按摩 (D)手指往舌根深部探查
- B** 20. 林老師懷孕第一胎，正為是否哺餵母乳與牛奶而猶豫，下列敘述何者正確？
 (A)牛奶含有較多的不飽和脂肪酸，易消化吸收
 (B)母乳中含 IgA，可以保護新生兒減少感染的機會
 (C)牛奶含較高的乳糖，可以增加新生兒的熱量
 (D)母乳含較高的蛋白質，可促進新生兒生長發育
- B** 21. 有關傳染病的敘述，下列何者正確？
 (A)感染腸病毒者都會有腸胃道症狀，如嚴重腹瀉
 (B)SARS 主要傳染途徑為接觸與飛沫，致病原為新發現的冠狀病毒
 (C)流行性感冒主要藉由空氣傳染，症狀一開始會有高燒、寒顫、頭痛、肌肉酸痛等現象
 (D)施打過流感疫苗的老人，在一年的疫苗效期內，得到感冒的機會很小
- B** 22. 林同學於進食營養午餐後，午睡起來即發生腹痛、上吐下瀉等症狀，陸續也有部份學童及教師出現相同症狀，林同學最有可能是何種細菌性中毒？
 (A)腸炎弧菌 (B)金黃色葡萄球菌
 (C)沙門氏桿菌 (D)肉毒桿菌
- A** 23. 有關學校衛生護士的職責，下列敘述何者錯誤？
 (A)掌管學校全部的健康教育活動
 (B)掌管學校衛生活動中之健康照護
 (C)健康諮詢者
 (D)擁護學童的健康權利
- B** 24. 有關為兒童進行視力檢查之敘述，下列何者最正確？
 (A)先檢查矯正視力，再裸視
 (B)使用 E 字視力表，學童應距離 6 公尺
 (C)視力檢查表亮度應有 300 至 500 米燭光
 (D)檢查視野時最好有窗戶，以使光源充足
- D** 25. 依據 2010 公布的急救程序，下列何者正確？ ①Airway 暢通呼吸道 ②Breathing 建立呼吸 ③Compressing 心外按摩 ④叫病患並呼救
 (A)①→②→③→④ (B)①→④→②→③
 (C)④→①→②→③ (D)④→③→①→②
- C** 26. H1N1 新型流感目前感染的人群以何者為主？
 (A)孕婦 (B)嬰幼兒
 (C)小於 50 歲的成年人與青少年 (D)老年人
- D** 27. 校護對於健康檢查結果所發現的缺點，通知家長、協助轉診並追蹤，是屬於下列何種功能？
 (A)預防 (B)檢查 (C)轉介 (D)矯治
- C** 28. 某位男童從事戶外活動時，不慎被蛇咬傷，下列處置何者錯誤？
 (A)在傷口附近做標記，並在給血清前，每 15 分鐘測量傷口腫脹情形
 (B)可給予廣效抗生素，以避免蛇口腔的細菌感染
 (C)若無法分辨何種蛇毒時，應注射神經性蛇毒血清，以減少過敏反應
 (D)注射破傷風免疫球蛋白，以防感染破傷風
- B** 29. 自閉症學童可能呈現的行為不包括下列那一項？
 (A)固著於刻板而重覆的身體動作，如：不停的旋轉
 (B)獨自與想像的玩伴互動及遊戲，如：自言自語
 (C)持續專注於物體的一部分，如：只瞪著眼看鈕扣
 (D)抗拒環境的變化，如：不願更換新的床單
- C** 30. 某學生上體育課時被球打到頭部倒地，校護用昏迷量表 (GCS) 評估其意識狀態，結果如下：呼喚時才睜開眼睛；無法遵從口令做動作，但會去除疼痛刺激源，與其交談回答清楚。其昏迷指數應為多少？
 (A)11 分 (B)12 分 (C)13 分 (D)14 分
- B** 31. 在進行青少年披衣菌(一種性病)盛行率調查時，先將縣市內國中和高中的學生依年齡分成三組，並考慮三個年齡組中的學生比例進行抽樣，之後再採集尿液檢體檢驗，此種抽樣方法屬於：
 (A)簡單隨機抽樣 (B)分層抽樣
 (C)系統性抽樣 (D)集束抽樣
32. 有關 b 型肝炎感染的敘述，下列何者正確？
 (A)傳染途徑主要是經口嚼食物餵食小孩
 (B)有逐年上升的趨勢
 (C)感染後，無論成人或年幼者均會轉成為慢性帶原者
 (D)b 型肝炎病毒表面抗原 (HBeAg) 檢驗若為陽性，代表傳染力很高
- D** 33. 下列何種案例是屬於三段五級預防中的第一段第二級？
 (A)李同學接受尿液篩檢
 (B)陳爺爺每年接受健康檢查
 (C)中風個案王奶奶經急性醫療服務後，接受復健治療
 (D)教導 45 歲的馬太太加強鈣質攝取
- D** 34. 我國對於 1~14 歲兒童之健康促進及保護計畫，其主要目標為何？
 (A)增加目標群體接受預防接種之比率
 (B)解決目標群體健康照護上問題
 (C)降低目標群體感染的發生率
 (D)減少目標群體意外傷害之發生率
35. SARS 流行期間，向學生宣導應均衡飲食、規律運動，此乃運用傳染病三角模式中的那一項原則？
 (A)增加宿主抵抗力 (B)阻斷傳染途徑
 (C)減少傳染源 (D)降低環境中病原的傳染力
- C** 36. 為提供高品質的健康服務，學校護士和學生人數的適當比例為何？
 (A)1:350 (B)1:500 (C)1:750



- D 37. 有關重高指數之敘述，下列何者不正確？
 (A)適用年齡從3-18歲
 (B)重高指數 = 體重(公斤) ÷ 身高(公分) ÷ 重高常數
 (C)男性的重高常數值大多比女性高
 (D)正常體重是指重高指數在1.10~1.20之間
- B 38. 為一位有氣喘病史的兒童安排教室環境，下列措施何者不適合？
 (A)勿使用冷氣或除溼機等
 (B)教室內使用地毯比塑膠地板合適
 (C)儘量不擺放毛茸茸的玩偶
 (D)每周用溼抹布清潔教室內之門、窗等
- D 39. 校護提供有自殺傾向學生之護理措施中，下列何者最不適宜？
 (A)與他訂定不自我傷害的行為契約
 (B)與導師一起評估與記錄其自殺危險性
 (C)請導師和家長注意其周遭環境的安全性，減少自殺的機會
 (D)當他情緒好轉、活動量增加時，表示危機解除，可減少給予關注
- A 40. 依 Green 所提出的 PRECEDE-PROCEED 衛生教育模式，下列指標何者屬於素質因素(Predisposing Factors)？
 (A)個人知識、態度及價值觀等
 (B)利用資源的便利性
 (C)父母、親友等之健康態度與行為
 (D)醫療設備的完備情形
- D 41. 某位9年級學生身高為160公分，體重為67公斤，請問此位學生的體重是屬於何種體型？
 (A)過輕 (B)正常 (C)過重 (D)肥胖
- D 42. 有關青少年自殺防治的相關敘述，下列何者錯誤？
 (A)校園憂鬱症的案例近年來有逐漸升高的趨勢
 (B)自殺的動機不是引人注意，而是一種求救行為
 (C)當與重要的人分離時，例如好友過世、父母離異等，都可能是引發自殺的原因
 (D)自殺無跡可尋，防不勝防
- C 43. 校護指導國小四年級學生貝氏刷牙法時，使用下列何種方式較為適合？ ①參觀法 ②遊戲法 ③腦力激盪 ④回覆示教法
 (A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- B 44. 以下何者不是國民小學晨間檢查的目的？
 (A)早期發現學童的異常狀態
 (B)協助學童學習環境整潔之維護
 (C)了解學童缺勤情形
 (D)養成學童個人良好的衛生習慣
- A 45. 「十年長期照顧計畫」中，喘息服務(respite care)主要是提供給下列那一類對象？
 (A)臥床個案之主要照顧者 (B)臥床個案
 (C)專業人員 (D)親戚朋友
- D 46. 校護在執行校園健康評估後發現下列四個健康問題，下列何者應最優先處理？
 (A)吸菸率升高 (B)體格缺點複診率偏低
 (C)憂鬱症比率升高 (D)腸病毒流行
- A 47. 國小5年級小偉患有缺鐵性貧血，校護提供小偉的衛教內容，下列何者錯誤？
 (A)服用鐵劑後大便變成灰白色是正常的
 (B)建議在餐前服用鐵劑效果會較好
 (C)多吃蘋果、菠菜、及全麥麵包
 (D)鐵劑不宜與牛奶或制酸劑一起服用
- D 48. 蘆同學因罹患地中海型貧血而需要經常輸血，其皮膚呈青銅色的原因為何？
 (A)膽紅素過高 (B)血色素過低
 (C)紅血球體積過小 (D)血中鐵質沉積
- D 49. 傳統性學校衛生「三三三模式」所指三大內容，不包括下列何者？
 (A)健康教學 (B)健康服務
 (C)健康環境 (D)健康諮詢
- A 50. 依據「傳染病防治法」最新規定，有關傳染病、歸類、通報時限的描述，下列何者正確？
 (A)H5N1流感/第一類/24小時內
 (B)H1N1流感/第一類/24小時內
 (C)桿菌性痢疾/第三類/一週內
 (D)腸病毒感染併發重症/第二類/24小時內
- D 51. 學校供應之便當或膳食應保留樣本至少幾小時，以便查驗？
 (A)12小時 (B)24小時 (C)36小時 (D)48小時
- B 52. 正常化(Normalization)是慢性病照顧中的主流概念，它的做法不包括下列那一項？
 (A)讓孩子參與各項決定及照顧計劃
 (B)鼓勵孩子一定要堅強，不必為疾病而改變任何目標
 (C)讓孩子認識及控制自我
 (D)以一般的家庭規範，來教導慢性病童及其他子女
- B 53. 以叩診進行正常兒童的身體評估，下列評估發現何者表示異常？
 (A)胃部可聽到鼓音 (B)肺部可聽到濁音
 (C)腹部可聽到鼓音 (D)肝臟可聽到濁音
- C 54. 某位八歲的女童突然癲癇發作，出現全身性強直一陣攣性發作，母親非常擔心她的病情及安全。下列措施何者較適當？
 (A)告訴父母，癲癇會突然發作而發生危險，故應避免兒童參與戶外活動
 (B)病童目前有使用抗癲癇藥物控制病情，不會再發作，故可放心
 (C)告訴父母規律服藥的重要性，通常是在他完全沒有發作2~4年後就會停藥
 (D)癲癇病童通常會合併智能障礙的問題，故在課業上不宜有所要求
- D 55. 小凡10歲，正在接受生長激素治療，此時護理人員應建議母親每天在下列那一時段為小凡注射生長激素？
 (A)清晨起床時 (B)午餐後 (C)晚餐前 (D)睡前
- D 56. 奇奇參加接力賽跑扭傷足踝，下列處理措施何者較不適當？
 (A)將下肢抬高 (B)用彈性繃帶包紮，固定足踝
 (C)囑其多休息、少走動 (D)立刻予以熱敷



B

57. 林小妹罹患白血病，化學治療期間血液檢查：絕對嗜中性白血球 (ANC) 數目為 $320/\text{mm}^3$ ，血小板為 $11 \times 10^4/\text{mm}^3$ ，紅血球為 $3.1 \times 10^6/\mu\text{L}$ ，血色素為 10gm/dL 。依據檢查結果，下列護理措施何者適當？
- (A) 須觀察皮膚、小便及大便情形，以早期發現自發性出血狀況。
 - (B) 病童處於易感染階段，須採保護性隔離措施。
 - (C) 因紅血球不足，須限制活動，減少耗氧量。
 - (D) 鼓勵攝入含鐵量高的食物，以提升血色素值。

A

58. 劉小弟今年十三歲，罹患風濕性心臟病且合併多發性關節炎，有關減輕關節疼痛的措施，下列何者錯誤？
- (A) 關節處施予冰敷減輕腫脹。
 - (B) 早晨起床活動前先服用止痛藥。
 - (C) 早晨起床活動前一小時予電毯使用。
 - (D) 鼓勵游泳，以維持各關節的活動度。

D

59. 國中校護欲對其教職員工進行體能狀況之評估，下列項目何者較不適切？
- (A) 心肺耐力
 - (B) 肌力與肌耐力
 - (C) 柔軟度
 - (D) 反射性調節

C

60. 下列何者是安全性行為的衛生教育中最佳的「學習目標」？
- (A) 個案能接受保險套的使用。
 - (B) 個案有正確的保險套使用知識。
 - (C) 個案每次性交使用保險套的比率提高 30%。
 - (D) 個案能體認保險套使用的重要性。

A

61. 校護教導第1型糖尿病患童居家的治療控制，下列敘述何者正確？
- (A) 注射部位需輪換以避免脂質增生，影響胰島素的吸收。
 - (B) 注射後應按摩注射部位，以促進胰島素的吸收。
 - (C) 使用二種胰島素注射時，應先抽混濁藥水，再抽澄清藥水。
 - (D) 血糖控制穩定後，即可改為口服降血糖藥控制。

D

62. 紿予病童 Digoxin 時，下列護理措施何者正確？
- (A) 最佳給藥時間是飯後馬上給。
 - (B) 服藥 20 分鐘後嘔吐，需再補給當次藥物。
 - (C) 可將 Digoxin 與果汁混合餵食，吸收效果較好。
 - (D) 忘記給藥的時間如未超過 6 小時，則可馬上補給藥物。

C

63. 有關血友病之敘述，下列何者正確？
- (A) 造成凝血功能障礙的原因是血小板過度破壞。
 - (B) 血友病的遺傳基因主要是來自父親。
 - (C) 鼓勵病童從事適度的活動，以強化其關節肌肉。
 - (D) 嚴重出血時，需立即輸注血小板。

A

64. 兒童癲癇突然發作時，下列護理措施何者正確？
- (A) 讓兒童保持側臥姿勢，以利其口腔分泌物流出。
 - (B) 固定兒童四肢，避免抽搐時發生骨折。
 - (C) 將緊閉的牙關打開，置壓舌板於口中，避免咬傷舌頭。
 - (D) 讓兒童平躺頭後仰，以維持呼吸道通暢。

C

65. 使用優碘 (beta iodine) 為新生兒進行臍部護理，可能會影響那一項新生兒篩檢的結果？
- (A) 苯酮尿症
 - (B) G-6-P-D 缺乏症
 - (C) 先天性甲狀腺功能低下症
 - (D) 高胱胺酸尿症

B

66. 下列何者屬於保護性健康服務？

- (A) 高血脂防治講座
- (B) 職場噪音管制方案
- (C) 校園兩性教育
- (D) 性暴力防治專線服務

A

67. 4 歲的王小妹，被診斷為口吃(stuttering)，最近開始上幼稚園，口吃更加嚴重。校護教導家屬處理王小妹的口吃問題，下列護理措施何者較適宜？
- (A) 減低其焦慮狀態並提升其自尊心。
 - (B) 多提供社交學習機會。
 - (C) 訓練適當的溝通與表達能力。
 - (D) 應用行為治療予以獎懲。

B

68. 有關物質濫用造成中毒反應的生理變化之敘述，下列何者錯誤？

- (A) 酒精之中毒反應包括欣快感、步態欠穩、不安、易怒、協調不佳，以及判斷力及注意力差。
- (B) 安非他命會產生沉默不語、瞳孔縮小、嗜睡、血壓下降。
- (C) 幻覺劑會產生知覺改變、錯覺、幻覺、自我感消失及時間感扭曲。
- (D) 大麻會產生心悸、欣快感、知覺誇大、輕鬆、嗜睡及被害妄想。

A

69. 一位 8 歲女生，罹患全身性紅斑狼瘡 (Systemic lupus erythematosus, SLE)，入院接受間歇式脈衝療法 (Pulse therapy)，應注意下列那些副作用？

- ① 高血糖
- ② 高血壓
- ③ 低血糖
- ④ 低血壓

- (A) ①②
- (B) ①④
- (C) ②③
- (D) ③④

A

70. 有關泌尿道感染之敘述，下列何者正確？

- (A) 若尿液培養菌落數達 10^5 / 毫升，即可確立診斷。
- (B) 最常見為沙門氏桿菌感染。
- (C) 若病童拒絕服藥，可停止服藥 1~2 次，不會影響治療效果。
- (D) 抗生素治療 48 小時後，尿液培養呈陰性，即可停藥。

A

71. 方小弟 10 歲，診斷為破傷風，下列護理措施何者錯誤？
- (A) 告知方小弟及其家屬戴口罩，做呼吸道隔離。
 - (B) 咽喉痙攣會造成肺部擴張不全及肺炎。
 - (C) 保持環境安靜，避免聲光刺激，以防止強直性痙攣之發生。
 - (D) 在病人單位備氣管切開術用具，以備不時之需。

A

72. 6 歲的王小妹，由媽媽送至醫院急診就診，媽媽主訴王小妹騎腳踏車不慎摔倒撞到頭。護理人員發現王小妹身上多處瘀傷，臀部及大腿有新舊不一的燙傷。下列護理過程何者不恰當？

- (A) 立即採取隔離保護措施，避免王小妹的媽媽接近。
- (B) 詢問王小妹受傷的時間、地點及事情發生的經過。
- (C) 評估王小妹的身心發展及行為態度。
- (D) 王小妹疑似受虐，應在 24 小時內向主管機關報備。

D

73. 唇腭裂修補手術，一般認為最好在兒童 2 歲以前完成，其最主要考量的原因為何？

- (A) 避免影響牙齒排列與發育。
- (B) 可進食固體食物，避免影響生長。
- (C) 避免嗆奶，以降低吸入性肺炎的機率。
- (D) 避免影響發音學習和語言的發展。



- B 74. 有關代謝症候群防治策略，下列何者不是初級預防？
 (A)建立健康生活型態 (B)參與三高到點篩檢
 (C)促進體適能 (D)控制體重
- A 75. 嬰幼兒接種b型流行性感冒嗜血桿菌疫苗，最主要是在預防那一種疾病？
 (A)腦膜炎 (B)腸胃炎 (C)風濕熱 (D)心肌炎
- A 76. 行政院環境保護署建議，家庭飲水最好在煮沸後，掀蓋再煮5分鐘，主要原因是因為水受有機物污染，經氯化後會形成三鹵甲烷，可能誘發下列何種疾病？
 (A)肝癌 (B)胃癌 (C)大腸癌 (D)皮膚癌
- D 77. 當校護發現下列那些傳染病個案時，應於一週內向主管機關報告並勸導隔離治療？ ①日本腦炎 ②腸病毒感染併發重症 ③登革熱 ④桿菌性痢疾 ⑤流感併發重症
 (A)①②③④⑤ (B)②③ (C)①② (D)①②⑤
- A 78. 小芳現在1個月大，被診斷有法洛氏四重畸形，在小芳開刀矯正之前，下列那一項護理措施不適當？
 (A)如果小芳發紺發作，趕快讓小芳平躺，抬高頭及胸部
 (B)避免小芳有便祕，並減少小芳哭泣的機會
 (C)可將奶嘴孔稍微加大，採少量多餐
 (D)家中常備小型氧氣筒，並教導小芳父母氧氣筒的使用方法
- A 79. 有關教育部主管各級學校緊急傷病處理準則的描述，下列何者錯誤？
 (A)應協助教職員工及學生定期接受基本救命術訓練課程至少16小時
 (B)學校護理人員應接受教學醫院或中央主管機關委託之機構、學校或團體辦理之救護技術訓練至少40小時
 (C)應將緊急傷病處理情形加以登錄(應包含傷病種類、發生時間、地點等)、統計分析
 (D)健康中心應設置攜帶式人工甦醒器
- B 80. 校護指導國小三年級學生預防近視方法，下列指導內容何者錯誤？
 (A)宜攝取足夠均衡營養，如蛋白質、維生素A和B等
 (B)看電視的距離，應距畫面對角線的4-5倍
 (C)看電視時間，每30分鐘宜休息10分鐘
 (D)對弱視學生，應轉介眼科作精密檢查
- A 81. 有關全民健保中規定的兒童預防保健服務給付次數之敘述，下列何者正確？
 (A)3歲以上至未滿7歲可檢查1次
 (B)1歲6個月以上至未滿2歲可檢查2次
 (C)2歲以上至未滿3歲可檢查2次
 (D)未滿1歲6個月可檢查6次
- B 82. 有關氣喘之敘述，下列何者錯誤？
 (A)氣喘發作時因呼吸道黏膜水腫、產生多量黏稠分泌物、呼吸道平滑肌痙攣而引起呼吸困難
 (B)監測肺部呼出氣流量，當尖峰呼氣流量值為理想值的60%-80%，表示其情況屬於綠燈區
 (C)血液檢查結果，嗜伊紅性白血球(eosinophilia)總數增加，表示有外因性誘發因子存在
 (D)常見到體內的IgE免疫球蛋白值會上升
- B 83. 為預防傳染病的患童有脫水的情形，教導調配口服脫水補充液 oral rehydration solution (ORS)，何者為非？
 (A)8平標準茶匙(40g)的蔗糖+1平標準茶匙的食鹽，調配成1公升水溶液
 (B)若不方便取得ORS時，建議可直接以運動飲料代替之
 (C)若需補充鉀，可多吃香蕉、椰子水
 (D)可在出現輕度脫水的症狀時，即可開始補充
- A 84. 關於先天性甲狀腺功能低下症 (Congenital hypothyroidism)，下列敘述何者正確？
 (A)在新生兒期的臨床表徵有餵食困難，活動過少等
 (B)確立診斷是依據甲狀腺素(T4)值過高，且甲狀腺刺激素(TSH)值過低
 (C)應在患童出生一歲後就開始治療，才不致影響智能
 (D)安撫父母，甲狀腺荷爾蒙藥物僅需要短期間服用
- C 85. 下列何者不是急性風溼熱所表現之臨床症狀？
 (A)多發性關節炎 (B)心臟炎 (C)腎臟炎 (D)舞蹈症
- A 86. 有關校園中糖尿病學童健康管理的敘述，下列何者有誤？
 (A)通知導師限制學童參與在校活動
 (B)提供糖尿病學童衛生教育與服務
 (C)指導導師、父母、學童認識血糖過高與過低的症狀
 (D)與糖尿病學童家長保持聯繫
- B 87. 有關兒童細菌性腦膜炎 (Bacterial Meningitis)的敘述，下列何者錯誤？
 (A)常見之病原菌為B型嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌及肺炎雙球菌
 (B)肺炎雙球菌腦膜炎病童的接觸者，應給予預防性抗生素
 (C)腦脊髓液中的葡萄糖濃度會降低、蛋白質濃度升高、革蘭氏染色呈陽性反應
 (D)腰椎穿刺的結果出來之前，可先給病童廣效性抗生素
- C 88. 有關燒傷兒童復健期返家之護理指導，下列敘述何者不適當？
 (A)藉由正確的姿勢、夾板固定或運動訓練，預防肢體攣縮
 (B)已癒合的表層燒傷植皮區，需防日曬，沐浴後以乳液擦拭
 (C)燒傷的幼兒在傷口癒合後，應24小時穿戴彈性衣，抑制疤痕增生
 (D)鼓勵家中成員、同儕探視燒傷的兒童，協助其接受
- B 89. 有關洗手的敘述，下列何者錯誤？
 (A)正確的步驟是濕、搓、沖、捧、擦
 (B)要用含有酒精成分的消毒液洗手才有效
 (C)用肥皂搓揉手心、手背及指縫至少20秒
 (D)指甲的長短會影響手部的清潔衛生
90. 初級救護技術員(EMT-I)之救護範圍不包括下列何者？
 (A)止血、包紮
 (B)基本心肺復甦術及清除呼吸道異物
 (C)血中氧及心電圖監測
 (D)使用自動心臟電擊去顫器(Automated External Defibrillator; AED)施行緊急救護



- D 91. 有關疥瘡的敘述，下列何者錯誤？
 (A)手腕、指縫間是易長疥瘡的部位
 (B)疥蟲只寄生在人的身上，不會傳染給其他動物
 (C)疥瘡的病灶主要為一顆顆的丘疹
 (D)需使用滅疥藥擦拭全身，且連續使用 3 天晚上
- B 92. 對隨身攜帶吸入性短效型支氣管擴張劑的學生，至少應在運動前多久使用此藥物？
 (A)即刻使用 (B)10~15 分鐘
 (C)30 分鐘 (D)1 小時
- D 93. 下列那種現象是休克早期的唯一臨床表徵？
 (A)血壓下降 (B)尿量減少
 (C)呼吸淺而快 (D)心跳變快
- B 94. 有關眼滴藥的使用，下列敘述何者錯誤？
 (A)先給眼藥水，再給眼藥膏
 (B)將眼藥滴（擠）於眼球上
 (C)滴完眼藥水後，請兒童閉上眼睛，並將眼球往各方向轉動
 (D)如兒童緊閉雙眼導致給藥困難時，可將眼藥水滴在內眼角的淚腺處
- B 95. 水質檢驗時，下列何者是用來檢測水體是否受到糞便污染之生物指標？
 (A)真菌 (B)大腸桿菌 (C)葡萄球菌 (D)細菌
- A 96. 目前台灣地區國小學童的尿液篩檢並未檢驗下列何項？
 (A)尿中非法藥物毒性 (B)尿潛血反應
 (C)尿糖 (D)尿蛋白
- C 97. 處理中暑學生，下列措施何者應避免？
 (A)移到陰涼處 (B)進入有冷氣的空間
 (C)給予飲下冰水降溫 (D)給予溫水飲用
- B 98. 下列何者不是一氧化碳中毒的症狀？
 (A)頭暈、視力模糊 (B)呼吸有水果味
 (C)皮膚及嘴唇呈桃紅色 (D)噁心、嘔吐
- C 99. 有關血友病 (Hemophilia) 的學童出血控制的護理措施，下列何者錯誤？
 (A)靜脈注射其所缺乏的凝血因子
 (B)出血部位需抬高且超過心臟高度
 (C)給予出血部位熱敷
 (D)出血處予以加壓固定不動
- A 100. 有關急性腎絲球腎炎 (acute glomerulonephritis, AGN) 的敘述，下列何者錯誤？
 (A)病童會排出少量深茶色尿液，且會造成代謝性鹼中毒
 (B)起因於 A 群 β 型溶血性鏈球菌的感染
 (C)好發在 6~12 歲之間，2 歲以下的兒童則很少發生
 (D)臨床表徵為臉部水腫、倦怠、厭食、嘔吐、腹痛等

※本試卷共 100 題、計 6 頁

☺☺☺☺☺ 敬祝金榜題名 ☺☺☺☺☺

