

注意事項：1.本試卷共 100 題、計 8 頁，請仔細檢查並注意題號、頁數，確認後開始作答。
2.一律於答案卡上作答，如未依規定塗寫不予計分。
3.配分方式：每題 1 分，答錯不倒扣，共 100 分。

1. 社區衛生護理師可利用下列何種評估工具瞭解家庭運用社會資源的情形？
(A) 家庭發展史
(B) 家族圖譜 (genogram)
(C) 家庭生態圖 (Eco-Map)
(D) APGAR 家庭功能評估表
2. 某學校向學生宣導每天跑步 15 分鐘，以維持適當體位。從預防疾病的概念而言，此措施屬於何種？
(A) 第一段第一級的預防
(B) 第一段第二級的預防
(C) 第二段第三級的預防
(D) 第三段第四級的預防
3. 下列何者是評估婦幼衛生保健工作成效的最佳指標？
(A) 粗死亡率
(B) 嬰兒死亡率
(C) 新生兒死亡率
(D) 孕產婦死亡率
4. 曾先生，63 歲，目前鼻胃管留置中，下列護理措施之敘述何者錯誤？
(A) 可讓曾先生嚼口香糖，以刺激唾液分泌
(B) 若引起喉部損傷不適，可請醫生給予麻醉性口含劑以減輕不適
(C) 需執行胃灌洗時，宜採用清水，以避免電解質不平衡
(D) 每日應清潔鼻孔及更換固定膠帶，以預防鼻部皮膚壓瘡
5. 有關心包膜炎造成心包膜積水之相關症狀，下列何者正確？
(A) 心輸出量增加
(B) 疼痛位置多為左側背部
(C) 嚴重時會出現頸靜脈怒張
(D) 聽診時心包膜摩擦音會更明顯
6. 服用過量巴比妥而導致意識喪失的病人，會出現下列何種現象？
(A) 因肺部血液分流增加而導致低血氧
(B) 因肺部氣體擴散能力下降而導致低血氧
(C) 因通氣能力下降而導致血中二氧化碳過高
(D) 因呼吸道阻力上升而導致血中二氧化碳過高
7. 病人使用陽壓呼吸器時，較不易出現下列那項合併症？
(A) 氣胸
(B) 高血壓
(C) 胃部脹氣
(D) 壓力性潰瘍
8. 有關蘇莫吉效應(Somogyi effect)，下列何者正確？
(A) 是一種反彈性低血糖症狀
(B) 常發生在使用高劑量胰島素之後
(C) 治療方式應採逐漸增加胰島素劑量
(D) 乃因晚餐前注射胰島素過少所引起
9. 有關鼻咽癌病人接受頭頸部放射線照射時之皮膚護理指導，下列何者錯誤？
(A) 不能冰敷或熱敷
(B) 不可曝曬陽光，外出使用陽傘
(C) 用中性肥皂清潔，記號不可洗掉
(D) 濕性皮膚脫屑，可依醫囑使用氧化鋅
10. 有關視網膜剝離手術病人之出院前護理指導，下列之敘述何者錯誤？
(A) 出院後需複診直到視力穩定為止
(B) 術後若視力改變，建議手術後 1 個月內更換眼鏡度數
(C) 就寢應戴護目眼罩，白天外出應戴保護性眼鏡
(D) 手術後 6 個月內應避免從事劇烈活動
11. 有關大面積重度燒傷病人初期(48 小時內)的病理生理變化，下列何者錯誤？
(A) 內分泌失調，易發生低血糖
(B) 腎臟灌流不足，易引起急性腎衰竭
(C) 心輸出量降低，易造成低血容積休克
(D) 血管壁的通透性增加，形成局部水泡或水腫
12. 有關開胸手術切除肺葉病人身上留置的兩條胸管功能之敘述，下列何者正確？
(A) 因手術傷口血水較多，故需兩條胸管同時進行引流
(B) 兩條胸管是為了引流肺部不同部位的血水
(C) 位置較低的胸管引流血水，位置較高的胸管引流氣體
(D) 位置較低的胸管為主要的血水引流管，位置較高的胸管是備用的
13. 有關下肢截肢手術後的護理措施，下列何者錯誤？
(A) 膝上截肢防範關節屈曲攣縮，鼓勵採俯臥姿勢
(B) 患肢抬高時間勿超過 24~48 小時，避免關節攣縮
(C) 於兩腿間置放枕頭維持外展姿勢
(D) 手術後立即使用彈性繃帶加壓包紮

14. 方先生，83 歲，於一個月前頭部不小心撞到門框，當時並無任何異狀，但近來常出現記憶力差、嗜睡等症狀。今早因意識越來越差，由家屬送至急診，經電腦斷層掃描診斷為慢性硬膜下出血，下列敘述何者正確？
(A) 此種出血多為靜脈出血
(B) 會出現鼻漏或耳漏
(C) 會出現巴特爾氏徵象(Battle's Sign)
(D) 會出現庫欣氏三病徵(Cushing's Triad)
15. 接受根治性腎臟切除術之病人，術後 24~48 小時需監測有無腎上腺功能不足之症狀，下列何者**錯誤**？
(A) 低血壓
(B) 高血鈉
(C) 尿量減少
(D) 意識程度改變
16. 邱先生，43 歲，不慎於工地高處墜落，診斷為第四胸椎受損，生命徵象出現血壓下降及心搏過緩，邱先生處於下列何種狀況？
(A) 絕對性低血容積休克
(B) 相對性高血容積休克
(C) 低心輸出量心因性休克
(D) 大量血管擴張神經性休克
17. 廖先生，47 歲，因瓦斯氣爆造成大面積燒傷，出現全身水腫，下列敘述何者正確？
(A) 此時體內血比容通常過高
(B) 因微血管通透性增加而水腫
(C) 燒傷後 24 小時體液會移回血管
(D) 會出現體液容積過多的健康問題
18. 甲狀腺切除術後，為避免傷口縫合處過度牽扯及減輕傷口腫脹不適，患者應採取何種姿勢？
(A) 俯臥，頭部轉向側邊
(B) 側臥，頭頸下墊枕頭
(C) 平臥，頭頸下墊枕頭
(D) 半坐臥，頭頸部以枕頭支托固定
19. 梁先生因車禍造成 C3-C4 壓迫性骨折，應在何時進行膀胱訓練？
(A) 剛入院時
(B) 脊髓休克期前
(C) 脊髓休克期後
(D) 出院當天
20. 下列何者不是嬰幼兒的正常神經反射現象？
(A) 3 個月大的嬰兒有擁抱反射(moro reflex)
(B) 10 個月大的嬰兒有手掌抓握反射(palmar grasp reflex)
(C) 11 個月大的嬰兒有巴賓斯基氏反射(Babinski's reflex)
(D) 18 個月大的幼兒有瞳孔反射(pupillary reflex)
21. 妞妞，4 歲，罹患急性淋巴性白血病(acute lymphoid leukemia; ALL)，目前接受化學治療中，其血液檢驗值：白血球為 $2,000/\text{mm}^3$ ；成熟嗜中性白血球(segment)為 15%；不成熟嗜中性白血球(band)為 1%；淋巴球(lymphocytes)為 70%；單核球(monocytes)為 14%，妞妞的絕對嗜中性白血球值(ANC)為多少？
(A) $150/\text{mm}^3$
(B) $320/\text{mm}^3$
(C) $700/\text{mm}^3$
(D) $1,400/\text{mm}^3$
22. 阿旺，10 歲，因患有主動脈狹窄(coarctation of the aorta)而住院進行檢查。有關護理評估，下列敘述何者**錯誤**？
(A) 上肢血壓高於下肢約 10-20 mmHg
(B) 主訴常會有頭痛、暈眩、流鼻血且腳部冰冷
(C) 股動脈搏動很弱，甚至摸不到
(D) 活動耐受性降低、疲倦、容易發紺且有杵狀指
23. 阿榮，7 歲，罹患急性腎絲球腎炎，有關實驗室檢查結果，下列何者較**不可能**出現？
(A) 血脂值增加
(B) 尿素氮增加
(C) 肌酸酐增加
(D) C-反應性蛋白質(CRP)增加
24. 有關嬰兒玫瑰疹(roseola infantum)，下列敘述何者**錯誤**？
(A) 當高燒突然消退時，皮疹出現
(B) 由軀幹蔓延到頸、臉，然後到四肢
(C) 疹子不會癢，加壓會變白色
(D) 一般會有脫屑及色素沉著情況
25. 幼兒罹患先天性髖脫位，以布萊安特氏(Bryant's)牽引器牽引時，應採何種姿勢？
(A) 側躺，患肢髖關節屈曲呈 20 度
(B) 垂頭仰臥，患肢利用牽引器向下牽引
(C) 半坐臥，將患肢拉高 45 度以砂袋固定
(D) 平躺、髖關節屈曲 90 度，雙腳向上牽引，臀部微離床面
26. 小方，患有腦膜炎，當醫師彎曲小方的頸部時，其膝關節會自動彎曲，並訴說疼痛，此現象稱為：
(A) 膝反射(Knee reflex)
(B) 蹠反射(Plantar reflex)
(C) 柯林氏徵象(Kernig's sign)
(D) 布魯辛斯基氏徵象(Brudzinski's sign)

27. 有關腸病毒(enterovirus)，下列敘述何者**錯誤**？
(A) 傳染途徑包括腸胃道、呼吸道及接觸方式
(B) 在發病前數天，兒童的喉嚨與糞便中，可發現具傳染力之病毒
(C) 呼吸道口沫中的病毒可存留 1~3 週
(D) 糞便中的病毒可存留 6 個月
28. 嬰幼兒罹患唇腭裂(cleft lip and palate)最常引起下列何種健康問題？
(A) 腹瀉
(B) 脫水
(C) 營養不足
(D) 反覆性中耳炎
29. 王女士採陰道生產，目前已進入第二產程，使用 Valsalva 長時間閉氣用力技巧，可能出現下列何種生理反應？
(A) 胸內壓降低
(B) 心輸出量上升
(C) 肺部靜脈回流降低
(D) 母血二氧化碳濃度降低
30. 黃女士待產時使用 Pitocin，有關用藥之監測，下列敘述何者正確？
(A) 間歇性使用胎兒監測器
(B) 2~3 分鐘宮縮一次才可使用
(C) 開始用藥的劑量為每分鐘 10 IU/c.c.
(D) 胎心率於 100 bpm 時應停止給藥
31. 張女士，懷孕 26 週，下列何者為正常的血液變化？
(A) 血紅素下降
(B) 血比容上升
(C) 白血球減少
(D) 纖維蛋白原減少
32. 服用口服避孕藥的禁忌症，下列何者**錯誤**？
(A) 有高血壓病史者
(B) 已有懷孕可能者
(C) 有子宮外孕史者
(D) 有血栓性疾病史者
33. 黃女士待產時胎心率發生變異性減速(variable deceleration)，下列何者為護理師優先執行的護理措施？
(A) 測量生命徵象
(B) 抬高黃女士頭部
(C) 觀察陰道有無出血
(D) 協助黃女士左側臥
34. 胎兒生理活動評估(Biophysical profile)測試內容中，以超音波評估的項目包括那些？
(A) 胎兒心跳、胎動、臍帶血流量、胎兒體重
(B) 胎兒呼吸、胎動、胎兒身體張力、羊水容積
(C) 胎兒心跳、胎動、臍帶血流量、胎兒身體張力
(D) 胎兒呼吸、臍帶血流量、胎兒體重、羊水容積
35. 有關糖尿病婦女於妊娠期間之護理措施，下列敘述何者正確？
(A) 避免夜裡發生高血糖症，睡前點心不可含碳水化合物
(B) 妊娠末期可藉由每週一次無壓力試驗，來確認胎盤功能
(C) 由羊水中卵磷脂與抱合髓磷脂之比值，確認胎兒有無神經管缺損問題
(D) 監測胰島素的需要量，若需要量未隨孕程增加，表示飲食計畫成效佳
36. 有關服用鋰鹽(lithium)的注意事項，下列敘述何者**錯誤**？
(A) 使用鋰鹽之前需檢驗病人的腎臟功能
(B) 初次服用鋰鹽 12 小時後需抽血檢驗鋰鹽濃度
(C) 病情穩定後每隔半年抽血檢驗鋰鹽濃度 1 次
(D) 鋰鹽濃度 > 2.0 mEq/L 出現中毒症狀時需立刻停藥
37. 梁先生，68 歲，入院期間頻頻擔憂睡眠不佳，現正服用 Alprazolam (Xanax®)，有關此藥物之敘述，下列何者正確？
(A) 為非 BZD 類藥物
(B) 注意暈眩並預防跌倒
(C) 主要用於抗精神病症狀
(D) 此藥之半衰期超過 24 小時
38. 為正確執行物質濫用個案之尿液篩檢，下列處置何者正確？
(A) 檢視尿液色澤及溫度
(B) 安排相同日期反覆收集查證
(C) 取中段 5 c.c. 尿液，務必確保無菌狀態
(D) 儘量在懷疑用藥日的 72 小時內進行尿液收集
39. 神經傳導物質失調引起精神疾病的相關假說，下列那一項敘述最適宜？
(A) 多巴胺活性過高與憂鬱症有關
(B) GABA 功能過高與焦慮疾患有關
(C) 正腎上腺素功能過低與躁症有關
(D) 乙醯膽鹼功能過低與阿茲海默症有關
40. 鈉離子滯留神經細胞內的濃度較一般人高出 200%，與下列何種疾患最有相關？
(A) 身體性疾患
(B) 解離性疾患
(C) 焦慮性疾患
(D) 雙極性疾患

41. 小龍，8 歲，有強直陣攣型癲癇的疾病史 (tonic clonic seizure)，今在學校突然癲癇發作，下列護理措施何者**錯誤**？
(A) 給予毛巾放入口中，以預防咬傷舌頭
(B) 鬆開衣領，維持通風，以免影響呼吸
(C) 移除身旁堅硬及尖銳物，以提供安全環境
(D) 協助採取側臥姿勢，以利口鼻分泌物流出
42. 有關早產兒發展照護，下列何者**錯誤**？
(A) 執行侵入性治療時，可給予寧握護理
(B) 為避免過度刺激早產兒，可將護理時間分散在每小時且動作需輕柔
(C) 加護病房的燈光會隨著日夜的變化來調整
(D) 提供舒適及正確擺位，使早產兒維持屈曲的姿勢，促進自我安撫及自我調節的能力
43. 欣欣二歲，因為要做腦波，醫囑開立給予鎮靜灌腸。護理人員剛灌完鎮靜藥後，欣欣立刻解出大便，此時護理人員應如何處理？
(A) 不必重新再灌
(B) 準備原劑量的二分之一，重新再灌一次
(C) 準備原劑量的四分之一，重新再灌一次
(D) 準備原來的劑量重新再灌一次
44. 王小弟，3 歲，罹患腎病症候群，目前採用類固醇治療，教導王小弟家屬照護原則，下列何者**不正確**？
(A) 血尿消失時，表示類固醇治療有效
(B) 在類固醇治療期間應暫停注射常規疫苗
(C) 免疫力下降，可以給予抗生素預防感染
(D) 急性期時，指導父母烹調食物避免另外加鹽或食用醃漬物
45. 周小妹，2 個月大，罹患先天性心臟病，有關教導媽媽居家照護注意事項，下列何者**錯誤**？
(A) 宜選擇柔軟洞口稍大的奶嘴
(B) 每次餵食時間不要少於 30 分鐘
(C) 宜少量多餐，給予高熱量飲食
(D) 母乳需擠出，再給予周小妹餵食或灌食
46. 下列有關照護川崎氏症 (Kawasaki Disease) 的敘述，何者正確？
(A) 禁止使用 Aspirin
(B) 協助口腔護理，增進口腔黏膜的舒適
(C) 注意下床安全及肢體保護，避免因舞蹈症受傷
(D) 需配合抗生素治療十天以上，密切觀察抗生素的副作用
47. 有關經前緊張症候群的飲食指導，下列何者最適當？
(A) 攝取低碳水化合物飲食
(B) 攝取富含葉酸的食物
(C) 每日攝取 1~2 杯黑咖啡
(D) 攝取富含維生素 B6 食物
48. 下列何者**不是**妊娠糖尿病孕婦之合併症？
(A) 死產
(B) 羊水過少
(C) 妊娠高血壓
(D) 新生兒低血糖
49. 林女士前一胎寶寶出生體重為 4,250 公克，則此次懷孕應於何時接受糖尿病篩檢？
(A) 10 週
(B) 14 週
(C) 18 週
(D) 24 週
50. 有關心臟病婦女妊娠期護理之敘述，下列何者**錯誤**？
(A) 採左側臥姿勢休息
(B) 每天應有至少 10 小時以上睡眠，以減少心臟負擔
(C) 孕期應避免服用毛地黃(Digitalis)，以免致畸胎
(D) 有上呼吸道感染應立即就醫，及早控制感染
51. 新生兒出生後要適應子宮外的環境，首先要建立呼吸的功能，下列何者不是影響新生兒第一次呼吸的因素？
(A) 肺微血管彈性
(B) 肺黏液稠度
(C) 肺容量彈性
(D) 製造肺泡表面張力素的能力
52. 丁小弟，出生體重 2,600 克，第 1 天母嬰同室時四肢末稍冰冷，體溫為 36°C，下列何者為最恰當的處置？
(A) 直接讓母親與新生兒有肌膚的接觸，以增加體溫
(B) 立即將新生兒用包巾包起來，以增加體溫
(C) 放入保溫箱中或輻射加熱床上加溫，以增加體溫
(D) 向母親解釋，這是新生兒正常的生理現象，不需要處理
53. 劉先生因患憂鬱症，住院期間不言不語，不吃不喝，護理人員與其會談時，劉先生都閉口不說話，下列何者為最合適的護理措施？
(A) 鼓勵劉先生下床參與病房作息
(B) 短暫而多次的陪伴劉先生
(C) 排住多人的病房以增加外界刺激
(D) 多探詢病人的心情與感受
54. 簡短智能評估表 (mini-mental status examination; MMSE) 為常用的認知功能評估量表，下列何者**不是**MMSE 的評估重點？
(A) 記憶力
(B) 定向感
(C) 價值觀
(D) 計算力

55. 馬先生，患思覺失調症約 2 年，近日與人爭吵，擔心會被殺害而不敢睡覺，整天疑神疑鬼，且對此想法堅信不移，無法接受別人的建議。有關馬先生防衛機轉之敘述，下列何者正確？
(A) 內射作用（introjection）
(B) 外射作用（projection）
(C) 否定作用（denial）
(D) 幻想作用（fantasy）
56. 有關腫瘤溶解症候群之臨床表徵，下列何者**錯誤**？
(A) 高血鉀
(B) 高血鈣
(C) 高尿酸
(D) 高血磷
57. 下列何種檢查**沒有**輻射危害？
(A) 骨掃描
(B) 電腦斷層
(C) 正子掃描
(D) 核磁共振攝影
58. 有關癌症病人臨床實驗室檢查結果之敘述，下列何者正確？
(A) 白血球數目一定是低於正常值
(B) 骨骼轉移，常出現高血鈣情形
(C) 化學治療破壞細胞，會使尿酸降低
(D) 腫瘤指標可作為診斷的依據
59. 有關登革熱之處置，下列何者**錯誤**？
(A) 只能採症狀及支持療法
(B) 使用含阿斯匹靈類之藥物以降低體溫
(C) 病人恢復後，只對此次感染之特定型登革熱有終生免疫力
(D) 病人需臥床休息，補充體液及高熱量高蛋白飲食
60. 有關自動體外心臟去顫器（AED）之敘述，下列何者**錯誤**？
(A) 政府立法於公共場所設置 AED 以即時搶救病人，同時讓施救者受到免責之保障
(B) 使用時機為病人出現心室纖維顫動或是無脈搏心室心搏過速
(C) 使用時有整流與去顫兩種功能
(D) 具有語音提示正確操作機器步驟之功能
61. 陳小姐診斷為腦下垂體腫瘤，進行經蝶骨腦下垂體切除術，術後出現尿崩症，下列敘述何者**錯誤**？
(A) 尿的顏色很淡
(B) 尿比重 < 1.005
(C) 血清鈉（Na⁺）<125 mEq/L
(D) 若不治療則會出現脫水的症狀
62. 慢性阻塞性肺部疾病病人最早出現的肺功能變化為下列何者？
(A) 用力呼氣時間延長
(B) 肺活量降低
(C) 肺餘容積上升
(D) 用力呼氣第一秒容積下降
63. 有關睪丸癌最主要的危險因子，下列何者正確？
(A) 隱睪症
(B) 精索曲張
(C) 長期接觸金屬物
(D) 無精蟲症
64. 酸雨是由何種公害所造成？
(A) 空氣汙染
(B) 水汙染
(C) 土壤汙染
(D) 噪音汙染
65. 小學二年級的大德早餐吃了蛋製品，餐後有腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐及發燒症狀。他最有可能是下列何種細菌引起之食物中毒？
(A) 金黃色葡萄球菌
(B) 肉毒桿菌
(C) 沙門氏菌
(D) 腸炎弧菌
66. 登階運動主要能加強哪一部分的健康體能？
(A) 肌力與肌耐力
(B) 心肺耐力
(C) 柔軟度
(D) 平衡力
67. 對於青少年懷孕，下列何者屬三段五級的第三級預防之措施？
(A) 衛教懷孕之青少年母乳哺育
(B) 提供留下孩子、流產、讓人收養的選擇之諮詢
(C) 早期發現懷孕青少年
(D) 提供特殊營養
68. 依據校園主要慢性病防治及個案管理手冊，在使用尖峰呼氣流速計時，哪個區間表示病情穩定？
(A) 尖峰呼氣流速值是最佳值的 60% 以下，變異度大於 30%
(B) 尖峰呼氣流速值是最佳值的 60-80%，變異度在 20-30%
(C) 尖峰呼氣流速值是最佳值的 80% 以上，變異度低於 20%
(D) 尖峰呼氣流速值是最佳值的 50-60%，變異度大於 30%

69. 對於癲癇小發作的描述，下列敘述何者正確？
(A) 意識完全清醒，但不會跌在地上
(B) 意識喪失，會跌倒在地上易受傷
(C) 意識不清，約 10 秒左右會呆滯且無法聽到別人在說什麼
(D) 意識清醒，但四肢痙攣
70. 50 班以上規模的學校，校園發生緊急傷病時，依據緊急傷病的處理分工及職責，下列何者較適合當現場指揮官？
(A) 校長
(B) 教務主任
(C) 學務主任
(D) 校護
71. 下列哪一個檢查可用來檢測兒童脊柱側彎？
(A) Adam's test
(B) Rinne test
(C) Point-to-point test
(D) Romberg's test
72. 學校護理師應採取下列哪些措施來協助氣喘學童？
①經由多管道來發現個案
②告訴全班同學有氣喘的學童，請大家幫忙監測其健康
③進行電話或家庭訪視，並提供家庭保健指導
④通報教育局
(A) ①③
(B) ②④
(C) ①②
(D) ③④
73. 急救方法中，哈姆立克法(Heimlich method)適用於下列何種情況？
(A) 支氣管異物阻塞
(B) 氣管異物部分阻塞
(C) 咽喉部異物完全阻塞
(D) 鼻腔異物阻塞
74. 關於水痘之敘述，下列何者**錯誤**？
(A) 依紅斑→丘疹→水疱→膿疱→結痂之變化順序發疹
(B) 發展迅速，在同一時間內可在不同的部位看到不同階段的發疹變化
(C) 疹子的分布首先出現在軀幹
(D) 出疹後，即不具傳染性
75. 依據行政院衛生署公布的預防接種時間表之規定，九個月大的嬰兒尚未接種的疫苗是什麼？
(A) 卡介苗(BCG)
(B) 麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)
(C) B 型肝炎疫苗(HepB)第三劑
(D) 結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)第二劑
76. 王小弟，10 歲，診斷為破傷風，下列護理措施何者**錯誤**？
(A) 告知王小弟及其家屬戴口罩，做呼吸道隔離
(B) 咽喉痙攣會造成肺部擴張不全及肺炎
(C) 保持環境安靜，避免聲光刺激，以防止強直性痙攣之發生
(D) 在病人單位備氣管切開術用具，以備不時之需
77. 學校護理師對於過去從未接種過麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)的國小一年級新生，依據國小新生入學後預防接種補種指引，應如何處理？
(A) 因可能已自然感染，無須再補接種
(B) 先安排血中抗體檢查，視抗體情況諮詢醫師決定
(C) 補接種 1 劑
(D) 補接種 2 劑
78. 強強，6 歲，在學校吃蒟蒻果凍不慎梗塞咽喉，目前意識清楚、呼吸困難、無法發聲，依哈姆立克法(Heimlich method)，護理師應如何協助強強？
(A) 讓強強站著，在強強背後以拳頭的拇指向其劍突下部位，快速向上重壓
(B) 讓強強彎下腰，以手掌在強強背後肩胛骨間拍擊 5 下
(C) 讓強強仰臥，在強強心外按摩的部位施行 4 次胸部重擊
(D) 讓強強側臥，以手掌在強強上腹部施壓
79. 依據學生健康檢查實施辦法，學生健康檢查實施後多久內，應將檢查結果通知學生及家長？
(A) 一星期
(B) 二星期
(C) 一個月
(D) 三個月
80. 有關幼兒口腔保健的敘述，下列何者**錯誤**？
(A) 睡前刷牙後口含氟錠可防止蛀牙
(B) 蛀牙的形成與甜食有密切的關係
(C) 最容易發生蛀牙的部位是在牙根的位置
(D) 多食用蛋、牛奶、蘿蔔、高麗菜等食物
81. 社區衛生護理師扮演的代言人(advocate)角色，下列敘述何者最適當？
(A) 於適當時機傳達案家的健康需求
(B) 與團隊共同合作解決案家健康問題
(C) 依個別需要及特質以適合方式給予護理指導
(D) 進入案家並盡力促使案家進行適度的改變
82. 評估影響學童口腔衛生的相關因素時，根據格林(Dr. Green)之 PRECEDE-PROCEED 模式，下列何者是屬於促成因素(enabling factors)？
(A) 學童對於口腔衛生的知識
(B) 校園內有可以潔牙的場所
(C) 父母對學童口腔衛生的態度
(D) 學童對於口腔衛生的看法

83. 有關國內接受免費乳癌篩檢之資格及頻率的敘述，下列何者正確？
(A) 40~44 歲其二親等內血親曾患有乳癌之女性或 45~69 歲者，每 2 年 1 次乳房 X 光攝影檢查
(B) 40~44 歲其二親等內血親曾患有乳癌之女性每年 1 次，其他 40 歲以上者每 2 年 1 次乳房 X 光攝影檢查
(C) 30 歲以上女，每 3 年接受 1 次乳房超音波檢查
(D) 45~69 歲婦女，每 2 年 1 次乳房超音波檢查
84. 依據職業安全衛生設施規則，雇主應對長期處於高噪音環境之勞工實施安全防護，下列何者錯誤？
(A) 勞工應戴耳塞、耳罩等防音防護具
(B) 強烈噪音之機具應隔離，並與工作場所分開
(C) 噪音高過 75 分貝之工作場所，需標示噪音危害公告
(D) 震動及噪音之機具，應有消音、震動隔離之材料
85. 有關結核菌素測驗(PPD test)的敘述，下列何者錯誤？
(A) 結核菌素是一種結核菌體蛋白，與卡介苗同樣屬活性減毒疫苗
(B) 通常注射於左手前臂中段的內側以 0.1 c.c.皮內注射
(C) 於注射後 48~72 小時判斷
(D) 腫脹 10 mm 以上者為陽性反應
86. 社區護理人員對於居家肺結核個案，下列何者為最優先的護理措施？
(A) 定期胸部 X-ray 檢查
(B) 常規性驗痰
(C) 監測結核菌素試驗
(D) 請個案按時服藥
87. 下列何者不是檢疫的對象？①已感染者 ②與病患接觸過的人 ③帶原者 ④病癒者
(A) ①②
(B) ②③
(C) ③④
(D) ①④
88. 社區衛生護理人員對於由疫區入境的民眾，採取防疫措施與協助調查傳染病來源，是屬於哪一段預防工作？
(A) 第一段預防
(B) 第二段預防
(C) 第三段預防
(D) 第四段預防
89. 學校護理師發現學生疑似遭到家暴，最適合採取下列何種行動？
(A) 通知校長及通報主管機關
(B) 建議學生打 113 婦幼專線
(C) 勸告父母不應體罰孩子
(D) 請學生的好朋友幫忙
90. 有關我國學校衛生的描述，下列何者錯誤？
(A) 教育部是全國最高學校衛生主管機關
(B) 實際執行學校衛生工作的負責單位是衛生保健組
(C) 我國學校衛生法於 2010 年通過
(D) 各縣市由教育局、處負責轄區內各相關學校之衛生工作
91. 林小弟，出生時，哭聲宏亮大聲，心跳速率：170 次／分，軀幹顏色粉紅，手腳微發紫，四肢屈曲彈性好，吸取鼻腔黏液時，臉部扭曲，其 Apgar scores 的評估數值何者正確？
(A) 10 分
(B) 9 分
(C) 8 分
(D) 7 分
92. 林小弟，5 歲，接受化學治療後出現食慾下降、噁心嘔吐且體重減輕。有關護理措施之敘述，下列何者錯誤？
(A) 鼓勵林小弟可共同選擇或準備餐點
(B) 林小弟想吃鮮奶、奶昔，可以讓他吃
(C) 以卡通樣式作為食物擺盤的依據
(D) 每天都須請林小弟一起測量體重
93. 有關燒傷兒童復健期返家之護理指導，何者不適當？
(A) 藉由正確的姿勢、夾板固定或運動訓練，預防肢體攣縮
(B) 已癒合的表層燒傷植皮區，需防日曬，沐浴後以乳液擦拭
(C) 燒傷的幼兒在傷口癒合後，應 24 小時穿戴彈性衣，抑制疤痕增生
(D) 鼓勵家中成員、同儕探視燒傷的兒童，協助其接受新的身體心像
94. 兒童鉛中毒時，下列哪一個系統功能受損最為嚴重？
(A) 腎臟
(B) 血液
(C) 呼吸
(D) 中樞神經
95. 陳小弟體重 6 公斤，二度燒傷，燒傷面積為 20%，急診住院，醫囑 8 小時內輸注 Lactated Ringer's solution 240c.c.，其輸液速率每分鐘應為多少微滴？
(A) 8
(B) 30
(C) 60
(D) 120

96. 3 歲的美麗，在家中誤喝漂白水，下列措施何者不適當？
- (A) 在 2 小時內，讓美麗喝水或牛奶，但勿超過 15 c.c./Kg
 - (B) 在 2 小時內，給予吐根糖漿(ipecac syrup)促使美麗嘔吐
 - (C) 帶著容器，儘早送美麗至醫院求診
 - (D) 依醫囑協助內視鏡檢查，以確立食道燒灼情形
97. 下列哪一項是適用於矯正脊柱側彎的裝備？
- (A) 帕米利克氏背帶(Pavlik harness)
 - (B) 法洛傑卡枕頭夾板(Frejka pillow splint)
 - (C) 人字形石膏
 - (D) 密爾瓦基氏(Milwaukee's)支架
98. 當進行新生兒評估時，發現其左右側大腿皺褶不對稱，且將大腿外展時可聽到咔嗒(click)聲時，會懷疑其有何徵象？
- (A) 歐氏徵象(Ortolani's sign)
 - (B) 葛氏徵象(Galeazzi's sign)
 - (C) 巴羅氏徵象(Barlow's sign)
 - (D) 哈特氏徵象(Hart's sign)
99. 下列何者為猩紅熱典型表徵之一？
- (A) 頭痛及後眼窩痛
 - (B) 扁桃腺充血腫脹及草莓舌
 - (C) 結膜炎及紅血球增加
 - (D) 頸部淋巴腺腫大及肌肉痛
100. 下列哪兩種傳染性疾病會出現手腳脫皮現象？
- (A) 風濕熱與麻疹
 - (B) 猩紅熱與川崎氏症
 - (C) 水痘與川崎氏症
 - (D) 猩紅熱與風濕熱

※ 本試卷共 100 題、計 8 頁

☺☺☺☺☺ 敬祝金榜題名 ☺☺☺☺☺